

Première S/Concours olympiades

1. Appréhender une nouvelle définition :

Exercice 5940



Un entier naturel non nul est un nombre Harshad s'il est divisible par la somme de ses chiffres.
Par exemple, $n=24$ est un nombre Harshad car la somme de ses chiffres est $2+4=6$, et 24 est bien divisible par 6.

- Montrer que 364 est un nombre de Harshad.
 - Quel est le plus petit entier qui ne soit pas un nombre Harshad?
- Donner un nombre Harshad de 4 chiffres.
 - Soit n un entier non nul. Donner un nombre Harshad de n chiffres.

Exercice 5941



A partir de deux nombres entiers positifs, on construit une liste de nombres où chaque nombre est la somme des deux précédents.

- Choisir deux nombres entiers positifs inférieurs à 10 et déterminer les dix premiers nombres de la liste définie précédemment.
- Un mathémagicien prétend être capable de déterminer rapidement et exactement la somme des dix premiers nombres d'une liste quelconque ainsi construite. Montrer que, quels que soient les nombres de départ, cette somme est multiple d'un des nombres de la liste dont on déterminera la position.

Exercice 5982



Une calculatrice défectueuse permet seulement :

- de taper des nombres positifs ou nuls ;
- de faire l'opération suivante : à partir de trois nombres entrés successivement $(x; y; z)$, elle affiche 0 si $x=y$ et le résultat de $\frac{z}{x-y}$ sinon.

$$(x; y; z) \rightarrow \begin{cases} \frac{z}{x-y} & \text{si } x \neq y \\ 0 & \text{si } x = y \end{cases}$$

- l'utilisation des parenthèses qui permet de composer des calculs.

- En détaillant les calculs, vérifier les résultats suivants donnés par la calculatrice :
 $(0; 1; 2) \mapsto -2$; $((2; 0; 1); 1; 1) \mapsto -2$

- Que donne $(2; 0; 1)$, $(0; 2; 1)$ et $(2; 1; (2; 1; 2))$?
- Donner un calcul permettant d'obtenir -1 .
- Vérifier que le calcul $(a; 0; 1)$ permet d'obtenir l'inverse de a pour tout $a > 0$.
- Proposer un calcul permettant de faire la division de deux nombres positifs : $\frac{a}{b}$ avec $a \geq 0$ et $b > 0$.
- Proposer un calcul permettant de faire la multiplication de deux nombres positifs : $a \times b$ avec $a \geq 0$ et $b \geq 0$.

Exercice 8128



Mesures d'angles à peu près

On dit qu'un triangle ABC est à peu près rectangle en un sommet A si la mesure de l'angle en A est dans l'intervalle $[75^\circ; 105^\circ]$. On dit qu'un triangle ABC est à peu près isocèle en un sommet A si les mesures des angles en B et en C diffèrent de 15° au maximum.

- Un triangle rectangle est-il à peu près rectangle? Un triangle isocèle est-il à peu près isocèle.
 - Un triangle peut-il être rectangle en deux sommets? A peu près rectangle en deux sommets? Le cas échéant, quant il est en plus acutangle (*c'est à dire que tous ses angles sont aigus*), est-il à peu près isocèle?
- Existe-t-il un triangle acutangle qui ne soit ni à peu près rectangle, ni à peu près isocèle?
- Ecrire un programme (*en langage naturel ou calculatrice*), à recopier sur votre copie, testant si un triangle ABC dont on connaît les trois angles A , B et C est à peu près isocèle.

Mesures de longueurs à peu près

Dans cette partie, on suppose qu'une unité de longueur a été donnée dans le plan, et on adopte les définitions suivantes :

- Deux points sont à peu près égaux si leur distance est inférieure ou égale à 0,1 ;
 - Deux segments sont à peu près de même longueur si leurs longueurs diffèrent de 0,1 ou moins ;
 - Un triangle est à peu près équilatéral si les longueurs de ses côtés diffèrent, deux à deux, de 0,1 ou moins.
- Un triangle rectangle dont l'hypoténuse mesure (*exactement*) 1 peut-il être à peu près équilatéral?

b. Un triangle rectangle peut-il être à peu près équilatéral?

2. On considère un cercle, de centre O de rayon (*exactement*) 2 et deux points de ce cercle: A , fixe, et B , mobile. On appelle I le milieu du segment $[OA]$ et H le projeté orthogonal de B sur la droite (OA) .

a. Représenter sur une figure l'ensemble des points B pour lesquels H et I sont à peu près égaux. En calculer la longueur (*le résultat sera donné arrondi au centième*).

b. Si H et I sont à peu près égaux, le triangle AOB est-il à peu près équilatéral?

2. Arithmétique :

Exercice 5942



1. a. En partant de 12 589 et en comptant de 29 en 29, peut-on atteindre le nombre 12 705?

b. En partant de 1 485 et en comptant de 29 en 29, peut-on atteindre le nombre 310 190? Expliquer votre démarche.

2. Quel est le plus petit entier positif à partir duquel, en comptant de 29 en 29, on peut atteindre 2013?


3. Existe-t-il des entiers positifs inférieurs à 2013 à partir desquels il est possible d'atteindre ce nombre aussi bien en comptant de 29 en 29 qu'en comptant de 31 en 31? Si oui, les trouver tous.

Exercice 5943



Un compteur est composé de trois roues crantées, nommées R_0 , R_1 et R_2 comportant toutes les trois 7 crans, numérotés de 0 à 6. Ce compteur est conçu de sorte que:

- Les roues tournent toujours d'un cran vers le cran suivant, dans cet ordre:
 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 0$
- Lorsque la roue R_0 effectue un tour complet, c'est à dire lorsqu'elle tourne de 7 crans alors la roue R_1 tourne d'un cran.
- Lorsque la roue R_1 effectue un tour complet, c'est à dire lorsqu'elle tourne de 7 crans, alors la roue R_2 tourne d'un cran.
- Initialement, les roues R_0 , R_1 et R_2 affichent toutes 0.



Entre chaque question, le compteur est remis à zéro, c'est-à-dire que chaque roue affiche de nouveau 0

1. On tourne la roue R_0 de 15 crans. Quels sont alors les numéros affichés par les roues?

2. On tourne la roue R_0 de 100 crans. Quels sont alors les numéros affichés par les roues?

3. On tourne la roue R_0 jusqu'à ce que la roue R_2 affiche 5 pour la première fois. De combien de crans a-t-on tourné R_0 ?

4. De combien de crans faut-il tourner R_0 pour que les

roues reviennent pour la première fois en même temps à 0?

5. On tourne la roue R_0 de 3580 crans. Quels sont alors les numéros affichés par les roues?

Exercice 5968



On considère des octogones réguliers, de même centre O . Aux sommets de l'octogone central, on note les huit premiers entiers non nuls.


Sur les sommets du deuxième octogone, on inscrit les 8 premiers nombres entiers suivants, avec une rotation de 45 degrés autour du point O .

Et ainsi de suite...

On dit que chaque nombre entier a une direction (A , B , C , D , E , F , G ou H par rapport à l'origine O).

Par exemple, 1 a pour direction A , 2 a pour direction B ...

Voici une figure représentant les quatre premiers octogones:



1. Quel sera le premier entier inscrit sur le quatrième octogone? Préciser sa direction.

2. Déterminer le premier entier inscrit sur le huitième octogone. Préciser sa direction.

Exercice 5984



On part d'un entier n strictement positif:

- Si n est pair, on le transforme en $\frac{n}{2}$
- Si n est impair ($n > 1$), on le transforme en $3n+1$.

- Si $n=1$, on s'arrête.

Exemples :

- Si $n=6$, on obtient la suite :
 $6 \mapsto 3 \mapsto 10 \mapsto 5 \mapsto 16 \mapsto 8 \mapsto 4 \mapsto 2 \mapsto 1$
- Si $n=13$, on obtient la suite :
 $13 \mapsto 40 \mapsto 20 \mapsto 10 \mapsto 5 \mapsto 16 \mapsto 8 \mapsto 4 \mapsto 2 \mapsto 1$

Il a été observé à l'aide d'un programme sur ordinateur, que pour chaque nombre entier testé, la suite aboutit toujours à 1. Mais ce résultat n'a pas été démontré à ce jour.

On peut par ailleurs, s'intéresser à la longueur de cette suite, qu'on notera $L(n)$.

Par exemple : $L(6)=9$ et $L(13)=10$.

- Déterminer $L(n)$ pour les entiers allant de 1 à 12.
- Soit p un entier, on considère l'entier $n=2^p$. Exprimer $L(n)$ en fonction de p .
- Trouver un nombre entier n compris entre 2^{2008} et 2^{2009} tel que :
 $L(n)=2012$.
Indication : On pourra chercher un nombre de la forme $2^p \times q$.
- Soit k un entier non nul.
 - Montrer que : $L(8k+4)=L(6k+4)+3$.
 - De même, montrer que : $L(8k+5)=L(6k+4)+3$.
 - Montrer que : $L(16k+2)=L(16k+3)$

Exercice 8129



Un ensemble S de rationnels est un ensemble arithmétique (en abrégé EA) si pour tout couple $(a; b)$ avec a et b appartenant à S , il existe un élément c de S tel que l'un des nombres a , b ou c est la moyenne arithmétique (c'est-à-dire la demi-somme) des deux autres. On souhaite déterminer tous les entiers n strictement positifs pour lesquels il existe

3. Equations et algèbre :

Exercice 5971



Calculer la somme suivante sans utiliser la calculatrice :

$$(1^2 - 2^2 - 3^2 + 4^2) + (5^2 - 6^2 - 7^2 + 8^2) + (9^2 - 10^2 - 11^2 + 12^2) + \dots + (2009^2 - 2010^2 - 2011^2 + 2012^2)$$

Exercice 5976



- L , S et V étant trois nombres réels positifs, montrer que les triplets $(a; b; c)$ solutions du système :

$$\begin{cases} a + b + c = L \\ ab + ac + bc = S \\ abc = V \end{cases}$$

sont tels que a , b et c sont les solutions de l'équation :
 $X^3 - L \cdot X^2 + S \cdot X - V = 0$

- Déterminer les dimensions d'un pavé droit dont la somme des longueurs de toutes ses arêtes est de 20 cm , la somme des aires des six faces est de 14 cm^2 et dont le volume est de 3 cm^3 .
- Quels sont les volumes minimum et maximum d'un pavé droit dont la somme des longueurs de toutes les arêtes est de 20 cm , la somme des aires des six faces est de 14 cm^2 .

4. Géométrie :

un EA ayant n éléments.

- Les ensembles suivants sont-ils des EA? Justifier.
 - $S_1 = \{0; 1; 2\}$ • $S_2 = \{0; 1; 2; 3\}$
 - $S_3 = \{0; 1; 2; 4\}$ • $S_4 = \left\{ \frac{1}{2}; \frac{3}{2}; 2; \frac{5}{2}; \frac{7}{2} \right\}$
 - Démontrer qu'il n'existe pas d'EA à 2 éléments. Que dire des singletons (ensemble à un seul élément)?
 - Donner un EA ayant 5 éléments, inclus dans l'intervalle $[0; 2]$, et contenant 0, 1, 2.
- Outre $\frac{a+b}{2}$, quels sont les deux autres rationnels à envisager pour vérifier qu'un couple $(a; b)$ d'éléments de S ne fait pas échec à la définition d'un EA?
 - On désire écrire un algorithme qui teste si un ensemble est un EA. L'ensemble S est décodé sous la forme d'une liste $S = [S[1], \dots, S[n]]$ de taille n . Par exemple la moyenne arithmétique du $i^{\text{ème}}$ et du $j^{\text{ème}}$ élément de S s'écrit $Se(S[i] + S[j])/2$.
 On dispose de plus d'une fonction **Appartient**(r, S) qui renvoie **Vrai** lorsque le rationnel r appartient à la liste S et **Faux** sinon.
 Compléter le squelette de la fonction ci-dessous (à recopier sur sa feuille de composition) pour qu'elle renvoie **Vrai** si, et seulement si, $S = [S[1], \dots, S[n]]$ est un ensemble arithmétique de longueur n .


```

fonction TesterEA(S=[S[1], ..., S[n]], n)
  Resultat ← Vrai
  Pour i de 1 à n
    Pour j de 1 à n
      [...]
    Fin Pour
  Fin Pour
  Renvoyer(Resultat)
          
```
 - Modifier la fonction pour qu'elle réalise moins d'opérations dans le cas général (à recopier sur sa feuille de composition).

Exercice 5969



A et B sont deux points d'un cercle de centre O et de rayon 5 tels que $AB=6$.

Le carré $PQRS$ est inscrit dans le secteur angulaire OAB de sorte que :

- P est sur le rayon $[OA]$;
- S est sur le rayon $[OB]$;
- Q et R sont deux points de l'arc de cercle reliant A et B .

1. Faire une figure correspondant à la situation proposée.
2. Calculer l'aire du carré $PQRS$.


Exercice 5975



Cinq cercles de rayon 1 cm ont été placés dans un carré comme l'indique le dessin.

Les cercles sont tangents entre eux et tangents aux côtés du carré.

Déterminer la longueur d'un côté du carré.




Exercice 5977



Un fermier dispose d'un grand terrain le long d'un mur et d'un grillage. Le long de ce même mur, il veut réaliser un poulailler sous la forme d'un triangle isocèle de sommet C . Le grillage ne sera pas posé contre le mur.

Quelle est l'aire maximale du poulailler sachant que le grillage a une longueur de 88 m ?

(On pourra utiliser l'angle au sommet et le fait que $\sin \theta \cdot \cos \theta = \frac{\sin(2\theta)}{2}$)




Exercice 5980



On donne un cercle \mathcal{C} de centre O et deux diamètres perpendiculaires $[AB]$ et $[CD]$. M étant un point du segment $[AB]$, on trace (CM) qui recoupe le cercle en N . La tangente en N au cercle et la perpendiculaire en M à (AB) se coupent en P . Montrer que :

$OP = CM$.



Exercice 8167



L'atelier de métallerie d'un chantier naval découpe des pièces de formes diverses dans des plaques d'acier carrées qu'il commande au laminoir.

Pour limiter les pertes de matière et donc les coûts de production, le chef d'atelier doit déterminer au préalable la taille des plaques carrées qu'il doit commander en fonction des pièces à découper.

Il arrive pour certaines commandes, que seuls la forme et la surface des pièces à découper leurs soient transmises.

Dans chacune des trois parties suivantes, on étudie la découpe de certains types de pièces.


Ces parties peuvent être traitées indépendamment l'une de l'autre.

On arrondira au besoin les longueurs au mm près, et les surfaces au cm^2 près.

Partie 1 : Découpe de pièces triangulaires

L'atelier doit produire une pièce à la forme d'une triangle équilatéral d'une surface de 20 m^2 .

Le chef d'atelier envisage deux solutions de découpe comme illustré sur les schémas suivants :



On note a le côté du triangle et c le côté du carré.

1. Schéma n°1 :

- a. Exprimer la hauteur h en fonction de a .
- b. En déduire le côté a du carré à construire pour respecter les contraintes.
- c. Calculer la surface d'acier perdue avec cette méthode.

2. Schéma n°2 :


- a. Justifier que l'angle \widehat{BAE} mesure 15° .
- b. En déduire le côté c du carré qu'il doit commander.
- c. Calculer la surface d'acier perdue avec cette méthode.
- d. Quel est le pourcentage d'acier gagné par rapport à la première proposition de découpe ?

Exercice 5967



Rappel : Aire d'un trapèze


$$A = \frac{(B + b) \times h}{2}$$




Une pizza rectangulaire $ABCD$ comporte de la croûte sur deux côtés consécutifs, $[DA]$ et $[AB]$. **On cherche comment partager la pizza en trois morceaux équitables** : chaque part doit avoir la même longueur de croûte et la même aire.

Dans chaque situation, on fixe la longueur du petit côté $AD=1$.


1. Dans le cas particulier ci-contre, on suppose que le partage réalisé est équitable. Quelle est la longueur AB ? Déterminer les longueurs : DF , FH et HC .



2. On généralise la situation en posant $AB=L$ (et en supposant toujours que $AD=1$). Déterminer, pour chaque situation ci-dessous, les longueurs utiles permettant de découper équitablement la pizza.



situation 1 : $L > 2$




situation 2 : $L < 2$

6. Probabilité :

Exercice 5983



Un dé tétraédrique comporte quatre faces comme le dé représenté ci-contre. Lorsqu'on jette un tel dé, le résultat est le nombre inscrit au plus près de la base tétraèdre. Dans notre exemple, le dé tétraédrique est tombé sur la face 4.



Antoine, Baptiste, Cyril et Diane jouent avec quatre dés tétraédriques réguliers et équilibrés mais qui ne sont pas numérotés de façon habituelle. Ainsi, le dé d'Antoine compte quatre faces numérotées 1, 6, 6 et 6. Avec ce dé, le nombre 1 est obtenu avec la probabilité $\frac{1}{4}$ et le nombre 6 avec la probabilité $\frac{3}{4}$.

- Le dé de Baptiste est numéroté 4, 4, 5 et 5 ;
- celui de Cyril 3, 3, 3 et 8 ;
- et enfin, celui de dianne 2, 2, 7 et 7.


1. Chaque joueur jette ce dé tétraédrique une fois. Qui a le plus de chances d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 6 ?
2. Les joueurs commencent une série de duels : Antoine

Exercice 5970



Dans un carré de 10 cm de côté, on veut réaliser un graphique statistique dans lequel les aires des 3 parties doivent être proportionnelles aux fréquences qu'elles représentent (O est le centre du carré).

Le point I est à 2 cm du sommet le plus proche.



Calculer les distances de J et K aux sommets du carré les plus proches.

Exercice 5978




On considère un triangle OAB équilatéral. On note R la mesure des côtés du triangle OAB .

On note \mathcal{C} le cercle de centre O passant par le point A .

Soit x un nombre réel tel que $0 < x < \frac{R}{2}$. On place le point M sur le segment $[AB]$ vérifiant :

$$AM = x.$$



On considère le cercle \mathcal{C}' de centre M et tangent au cercle \mathcal{C} au point N .

Exprimer le rayon du cercle \mathcal{C}' en fonction de R et de x .

joue contre Baptiste, Baptiste joue contre Cyril, Cyril joue contre Diane, Diane joue contre Antoine. Le gagnant de chaque duel est le joueur qui a obtenu le résultat le plus élevé.

- a. Montrer que dans le premier duel Antoine gagne contre Baptiste avec une probabilité de $\frac{3}{4}$.
 - b. Donner les probabilités de gain des joueurs dans les trois autres duels.
3. Antoine, Baptiste, Cyril et Diane jettent simultanément leur dé. Celui des quatre joueurs qui obtient le plus grand nombre gagne.
 - a. Montrer que la probabilité que Baptiste gagne est égale à $\frac{3}{32}$.
 - b. Qui a le plus de chances de gagner ce jeu ?

Exercice 8130



Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2. On dispose d'une urne contenant n boules pouvant être de différentes couleurs.

Le jeu consiste à extraire au hasard une boule de l'urne, puis

sans remettre celle-ci dans l'urne à extraire une seconde boule de l'urne. Le joueur a gagné lorsque les deux boules tirées sont de la même couleur.

On admet qu'à chaque tirage, toutes les boules de l'urne ont la même probabilité d'être tirées.

On dit que le jeu est équitable lorsque la probabilité $P(G)$ que le joueur gagne est égale à $\frac{1}{2}$.

1. a. Démontrer que si l'urne contient 10 boules dont 4 blanches et 6 rouges alors $\mathcal{P}(G) = \frac{7}{15}$.
b. Calculer $\mathcal{P}(G)$ lorsque l'urne contient 12 boules dont 4 blanches, 6 rouges et 2 noires.
2. Dans cette question, l'urne contient 6 boules rouges et d'autres boules qui sont toutes blanches.
a. Soit x le nombre de boules blanches contenues dans l'urne.

Démontrer que : $\mathcal{P}(G) = \frac{x(x-1)+30}{(x+6)(x+5)}$

- b. Combien faudrait-il de boules blanches pour que le jeu soit équitable?
3. Dans cette question, l'urne ne contient que des boules de deux couleurs différentes.
a. On suppose que l'urne présente la configuration $(a; b)$, c'est-à-dire qu'elle contient, par exemple, a boules rouges et b boules blanches. Démontrer que le jeu est équitable lorsque $n = (a-b)^2$
b. Réciproquement, démontrer que si n est le carré d'un entier p alors il existe deux entiers naturels a et b avec $a \geq b$ que l'on exprimera en fonction de p tels que la configuration $(a; b)$ conduise à un jeu équitable.
c. Donner six couples $(a; b)$ conduisant à un jeu équitable.

7. Annales toutes séries :

Exercice 5938



On suppose qu'il existe une fonction f définie sur l'ensemble des entiers naturels \mathbb{N} vérifiant la propriété :

$$(E) : \text{pour tous } x \text{ et } y \text{ de } \mathbb{N}, \quad f(x+y) = f(x) \cdot f(y) - x \cdot y$$

Préliminaire

Démontrer que $f(0)=1$. On pourra admettre les résultats dans les parties suivantes.

A. Etude d'un premier exemple :

On suppose ici que : $f(1)=3$.

1. Calculer $f(2)$ puis $f(3)$.
2. Montrer par deux calculs distincts que $f(4)=60$ et que $f(4)=63$. Conclure.

B. Etude d'un second exemple :

On suppose ici que : $f(1)=0$.

1. Calculer $f(2)$, $f(3)$ et $f(4)$.
2. Conjecturer l'expression de $f(n)$ en fonction de n .
3. Démontrer cette conjecture.
4. Prouver que pour la fonction trouvée aux 2. et 3. la propriété (E) est bien vérifiée.

C. Cas général

Première partie : on note $f(1) = a$

1. Exprimer $f(2)$ et $f(3)$ en fonction de a .
2. Exprimer $f(4)$ en fonction de a de deux manières différentes.
3. En déduire que : $a=0$ ou $a=2$.

Seconde partie : on étudie le second cas :

On suppose ici que : $f(1)=2$.

Exprimer $f(n)$ en fonction de n .


8. Annales série S :

Exercice 8131



On lance deux dés D_a et D_b successivement et indépendamment ; on considère le total de points ainsi ramené et sa probabilité d'apparition. Par exemple, avec deux dés standards à six faces, si le premier jet fournit le 1, et le second le 1 aussi, le total vaudra $1+1=2$, et sa probabilité d'apparition $\frac{1}{12}$. L'étude statistique de ces sommes peut intervenir dans certains jeux de hasard, le jeu de l'Oie par exemple.

Jusqu'en question 6, les dé envisagés sont tétraédriques, comme dans le croquis ci-contre. En question 1 et 2, leurs quatre faces sont standards, numérotées 1, 2, 3, 4.



1. Donner les trois manières d'obtenir pour total 6, en déduire que la probabilité d'obtenir un total de 6 est $\frac{3}{16}$.
2. Donner les différents totaux que l'on peut ainsi atteindre, puis leurs probabilités d'apparition. Qu'indiquent les coefficients de l'expression polynomiale $P(x) = (x+x^2+x^3+x^4)^2$ une fois développée? Expliquer.

Pour plus d'originalité, on prend maintenant des dés non standards: un dé \mathcal{D}_1 aux faces numérotées 1, 1, 2, 5 et un dé \mathcal{D}_2 aux faces numérotées 1, 4, 4, 4.

3. Quelle est la probabilité d'obtenir un total de 6?

De manière générale, le dé D_a a quatre faces dont les valeurs a_1, a_2, a_3, a_4 vérifient $1 \leq a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq a_4$ et sont stockées dans un tableau $t_a = [a_1, a_2, a_3, a_4]$. De même, le dé D_b a quatre faces b_1, b_2, b_3, b_4 vérifiant $1 \leq b_1 \leq b_2 \leq b_3 \leq b_4$ et stockées dans le tableau $t_b = [b_1, b_2, b_3, b_4]$. On définit les quantités polynomiales:

$A(x) = x^{a_1} + x^{a_2} + x^{a_3} + x^{a_4}$ et $B(x) = x^{b_1} + x^{b_2} + x^{b_3} + x^{b_4}$
Par exemple, les dés de la question 3. donnent lieu à:

- $t_a = [1, 1, 2, 5]$ • $t_b = [1, 4, 4, 4]$
- $A(x) = 2x + x^2 + x^5$ • $B(x) = x + 3x^4$

4. Déterminer $t_a, t_b, A(x), B(x)$ attachés aux dés D_a et D_b de faces 1, 2, 2, 3 et 1, 3, 3, 5.

5. L'algorithme suivante (qu'il sera possible d'étendre à de grands dés) renvoie le coefficient de x^k dans le produit $x^p(x^{b_1} + x^{b_2} + x^{b_3} + x^{b_4})$.
Modifier cet algorithme pour qu'il renvoie le coefficient

de x^k dans le produit $A(x) \cdot B(x)$ de deux dés à n faces.

Le colonel George Sicherman (*Etats-Unis, XX^e siècle*) rechercha des couples de dés non-standards D_a et D_b dont les sommes des faces obéissent aux mêmes lois de probabilité que celles de deux dés standards. Voici comment il a pu procéder, d'abord sur des dés à quatre faces.

1. On reprend les notations $1 \leq a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq a_4, 1 \leq b_1 \leq b_2 \leq b_3 \leq b_4$ et $P(x) = (x + x^2 + x^3 + x^4)^2$
 - a. Justifier que $A(x) \cdot B(x) = P(x)$.
 - b. Factoriser $x + x^2 + x^3 + x^4$ en ne faisant apparaître que des quantités de degrés 1 et 2.
 - c. Que valent $A(0), A(1), B(0), B(1)$?
 - d. Proposer dès lors une répartition possible et viable des facteurs de P entre A et B , définissant un bon couple de dés non standards.
2. Déterminer un couple de dés non standards à 6 faces dont la somme des faces obéit à la même loi de probabilités que celle de deux dés standards (aux faces: 1, 2, 3, 4, 5, 6)

9. Annales séries autres que S :

Exercice 8132



Pour tous entiers naturels m et n , on appelle triangle de m par n , et on note $m\Delta n$, le nombre défini par les règles suivantes, dont on admet qu'elles sont possibles :

- $0\Delta n = n + 1$
- $n\Delta 0 = (n - 1)\Delta 1$ dès que $n \neq 0$;
- $(n+1)\Delta(m+1) = n\Delta((n+1)\Delta m)$

Attention, $m\Delta n$ n'est pas nécessairement égal à $n\Delta m$.

Quelques résultats

1. a. Montrer que: $1\Delta 0 = 2$ et $1\Delta 1 = 3$
 - b. Calculer $1\Delta 2$
 - c. Plus généralement, déterminer, pour tout entier naturel n , la valeur de $1\Delta n$. On pourra poser $u_n = 1\Delta n$ et vérifier que la suite (u_n) est arithmétique.
2. a. Calculer $2\Delta 0, 2\Delta 1$ et $2\Delta 2$.
 - b. Justifier, que pour tout entier nature n : $2\Delta n = 2n + 3$
3. a. Calculer $3\Delta 0, 3\Delta 1$ et $3\Delta 2$.
 - b. Démontrer que, pour tout entier naturel n , $3\Delta n$ est égal à $2^{n+3} - 3$. On pourra poser $u_n = 3\Delta n$ et montrer que, pour tout n supérieur ou égal à 1 :

$$u_n = 2 \cdot u_{n-1} + 3.$$

Illustration de $3\Delta n$

Un artiste a illustré ainsi les valeurs $3\Delta 0$ et $3\Delta 1$:




Figure 1

Figure 2

1. Tracer sur la copie une troisième figure qui viendrait logiquement compléter cette suite de dessins et illustrer la valeur de $3\Delta 2$.
2. Supposons que le côté d'un carré de la figure 1 mesure 1 cm.
 - a. Déterminer l'aire respective des figures 1 et 2.
 - b. Quelle serait l'aire de la figure illustrant $3\Delta n$? On ne tiendra pas compte des recouvrements éventuels.

255. Exercices non-classés :

Exercice 7317




Echanges thermiques

En architecture, on appelle *facteur de compacité* d'un bâtiment le rapport de la surface extérieure - y compris la base en contact avec le sol - de ce bâtiment, mesurée en m^2 , à son volume, mesuré en m^3 . Le *facteur de compacité* $c = \frac{S}{v}$, exprimé en m^{-1} , donne une première évaluation grossière des performances thermiques d'une construction d'habitation.

1. Calculs de compacité pour quelques volumes usuels, dessinés ci-dessous.

- Déterminer le facteur de compacité du cube de côté a .
- Déterminer celui d'une demi-sphère de rayon r . On rappelle que le volume d'une sphère de rayon r est $\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$ et que sa surface a pour aire $4 \cdot \pi \cdot r^2$.
- Déterminer celui d'une pyramide régulière à base carré de côté a , et de hauteur verticale a .



- En quoi, d'après vous, le facteur de compacité est lié aux performances thermiques d'un bâtiment?

2. On se propose d'étudier le facteur de compacité d'un pavé droit de volume 1 dont les dimensions sont x , y et z .

- Vérifier que pour tous nombres a , b et c :

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3 \cdot a \cdot b \cdot c = \frac{1}{2} \cdot (a+b+c) [(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2]$$

- En déduire que pour tous nombres réels positifs a , b et c :

$$a^3 + b^3 + c^3 \geq 3 \cdot a \cdot b \cdot c$$

- En déduire que pour tous nombres réels positifs A , B et C dont le produit est égal à 1: $A+B+C \geq 3$

- Montrer que le facteur de compacité de ce pavé est:

$$c = 2 \cdot \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right)$$

Exercice 7318



Liber abaci

Il y a 4000 ans, les anciens égyptiens utilisaient en calcul une propriété arithmétique bien étonnante: tout nombre rationnel $\frac{p}{q}$ strictement positif s'écrit comme une somme de fractions unitaires, c'est-à-dire d'inverses d'entiers positifs, tous différents les uns des autres. Depuis lors, une telle décomposition s'appelle une "écriture égyptienne". Ainsi, la somme $\frac{1}{6} + \frac{1}{17} + \frac{1}{102}$ est-elle une "écriture égyptienne" du quotient $\frac{4}{17}$, tandis que les sommes $\frac{1}{17} + \frac{1}{17} + \frac{1}{17} + \frac{1}{17}$ et $\frac{1}{17} + \frac{3}{17}$ n'en sont pas. Plusieurs questions sur ces écritures demeurent, aujourd'hui encore, ouvertes.

- Pourquoi les deux dernières décompositions données en préambule ne sont-elles pas des "écriture égyptiennes"? Proposer une écriture égyptienne de $\frac{2}{3}$ comportant deux fractions unitaires, puis une autre de $\frac{2}{3}$ en comportant trois.

2. Un algorithme

Soient p et q deux entiers tels que $0 < p < q$. Le quotient $\frac{p}{q}$ est donc un élément de $]0; 1[$.

```

k ← 1
p1 ← p
q1 ← q.
Tant que pk ≠ 0
    Déterminer le plus petit entier positif nk
    tel que :  $\frac{1}{n_k} \leq \frac{p_k}{q_k}$ .
    Ainsi :  $\frac{1}{n_k} \leq \frac{p_k}{q_k} < \frac{1}{n_k - 1}$ 
    pk+1 ← pk · nk - qk
    qk+1 ← qk · nk
    Ainsi :  $\frac{p_{k+1}}{q_{k+1}} = \frac{p_k}{q_k} - \frac{1}{n_k}$ 
    Incrémenter k
    c'est-à-dire augmenter la valeur du
    compteur k d'une unité.
Fin du Tant que
    
```

- On fait ici tourner l'algorithme sur le quotient $\frac{p}{q} = \frac{1}{4}$.

Au début du premier tour de boucle:

$$k=1 ; p_1=4 ; q_1=17.$$

On détermine alors $n_1=5$. Puis $p_2=3$, $q_2=85$ et k vaut 2 avant d'entrer dans le deuxième tour de boucle. Poursuivre jusqu'à l'arrêt complet.

$$\text{Que vaut } \frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} + \frac{1}{n_3} + \frac{1}{n_4} ?$$

Les quatre fractions unitaires sont-elles distinctes?

- On suppose que l'algorithme prend fin à l'issue du $N^{\text{ème}}$ tour de boucle. Justifier qu'il permet de donner une "écriture égyptienne" du quotient $\frac{p}{q}$.
- Justifier clairement que l'algorithme ne peut être illimité.


Cet algorithme permet donc de donner une "écriture égyptienne" de n'importe quel nombre rationnel élément de $]0; 1[$. Il appartient à une classe d'algorithmes dits "gloutons" et est attribué à Léonard de Pise, auteur du *Liber abaci* (1202).

L'adjectif "glouton" s'applique à des algorithmes faisant, à chaque étape, un choix optimal. L'optimalité globale n'est pas nécessairement atteinte comme en témoignent les deux décompositions de $\frac{4}{17}$ rencontrées dans ce problème.

Exercice 7319




On dispose de n pions verticalement. Ils sont noirs sur une face, blancs sur l'autre, et sont numérotés de 1 à n . Au début du jeu, chaque pion présente aléatoirement sa face noire ou sa face blanche. **A chaque coups - qu'on appelle une opération dans toute la suite - on retourne un des pions et tous ses voisins du dessus.**



Le dessin ci-contre donne l'exemple du changement qu'apporte à une configuration initiale une opération avec le troisième jeton.

L'objectif du jeu est de trouver une séquence d'opérations telle que tous les pions montrent leur face blanche.

1. L'ordre dans lequel se succèdent deux opérations a-t-il de l'importance?
2. Quel est l'effet combiné de deux opérations identiques?
3. Indiquer les numéros des pions à retourner pour ne voir que des faces blanches, dans les situations représentées ci-dessous.



4. On donne l'algorithme suivant, pour une configuration de n cases :

Pour k allant de n à 1 par pas de -1

Si le jeton k est noir, effectuer une opération avec ce jeton

Fin Pour

- a. Expliquer pourquoi cet algorithme blanchit la colonne en un minimum d'opérations. Combien d'opérations met-il au maximum en oeuvre?
- b. Donner un exemple de configuration de n cases nécessitant n opérations.