

# Hors programme lycée/Dérivées

## 2. Nombres dérivés à gauche et à droite :

### Exercice 3483



On considère la fonction  $f$  dont l'image d'un nombre  $x$  est définie par la relation :

$$f(x) = \left(\frac{1}{2} \cdot x + 2\right) \cdot \sqrt{x^2 + 2x + 1} + 1$$

- Déterminer l'ensemble de définition de la fonction  $f$ .
- a. Etablir l'égalité suivante pour tout nombre réel  $h$  :

$$\frac{f(-1+h) - f(-1)}{h} = \frac{(h+3) \cdot \sqrt{h^2}}{2 \cdot h}$$

- b. En déduire la valeur des deux limites suivantes :


$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(-1+h) - f(-1)}{h} \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(-1+h) - f(-1)}{h}$$

- Que pouvez-vous dire sur l'aspect de la courbe  $\mathcal{C}_f$  au point d'abscisse  $-1$ ? (tracer la courbe à l'aide d'une calculatrice)

### Exercice 3484



Dans le plan muni d'un repère  $(O; I; J)$ , on considère la courbe  $\mathcal{C}_f$  représentative d'une fonction  $f$ . Voici sa représentation :



- Justifier que la fonction  $f$  n'est pas dérivable pour l'abscisse du point  $C$ .

- a. Graphiquement, déterminer les deux limites suivantes :

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(-2+h) - f(-2)}{h} \quad ; \quad \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(-2+h) - f(-2)}{h}$$

- b. La fonction  $f$  est-elle dérivable en  $-2$ ?

- Déterminer, graphiquement, la valeur des nombres dérivés de la fonction  $f$  aux abscisses des points  $B$  et  $D$ .

### Exercice 3485



On note  $f$  la fonction racine carrée ; cette fonction est définie sur  $\mathbb{R}_+$ .

- Considérons  $x \in \mathbb{R}_+$  et  $h \in \mathbb{R}$  tel que  $[x-h; x+h] \subset \mathbb{R}_+$

- a. Etablir la limite suivante :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h}$$

- b. En déduire la valeur du nombre dérivée de la fonction  $f$  en  $x \in \mathbb{R}_+$ .

- a. Déterminer la valeur de la limite suivante :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{x}$$

- b. Que peut-on dire de la dérivabilité de la fonction  $f$  en  $0$ ?

### Exercice 3508



- Justifier la non-dérivabilité en  $0$  des fonctions suivantes :

- $f(x) = \sqrt{x}$
- $g(x) = |x|$

- $h(x) = \sqrt{x^2 + x}$

- Considérons la fonction  $j$  définie sur  $\mathbb{R}$  par la relation :  $j(x) = x \cdot |x|$

Justifier que la fonction  $j$  est dérivable en  $0$ .

### Exercice 3533



On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  dont l'image d'un nombre  $x$  est donnée par la relation :

$$f(x) = \frac{1}{2} \cdot x \cdot \cos(2 \cdot x)$$

- a. Déterminer l'équation de la tangente  $(T)$  à la courbe  $\mathcal{C}_f$  au point d'abscisse  $0$ .

- b. Justifier que  $(T)$  est également la tangente à la courbe  $\mathcal{C}_f$  au point d'abscisse  $\pi$ .

- c. Etudier la position relative de  $\mathcal{C}_f$  et de  $(T)$

- On considère la droite  $(d)$  d'équation :

$$y = -\frac{1}{2} \cdot x.$$


- a. Justifier que la droite  $(d)$  est tangente à la courbe en plusieurs points.

- b. Etudier la position relative de  $(d)$  et  $\mathcal{C}_f$ .

- a. Compléter le tableau de valeur suivant :

$x$	$\pi$	$2\pi$	$3\pi$	$4\pi$
$f(x)$				

- b. Effectuer le tracé de la courbe  $\mathcal{C}_f$  sur  $\mathbb{R}_+$



4. a. Etudier la parité de la fonction  $f$ .  
 b. Effectuer le tracé de la courbe  $\mathcal{C}_f$  sur  $\mathbb{R}_-$

### 3. Développement limité :

#### Exercice 3504

1. Soit  $f$  une fonction définie en 0 telle que :  
 $f(x) = a \cdot x + b + x \cdot \varepsilon(x)$  où  $a \in \mathbb{R}$ ,  $b \in \mathbb{R}$  et  $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$   
 Montrer que la fonction  $f$  est dérivable en 0.
2. Soit  $g$  une fonction définie en 0 dont l'image de  $x$  est définie par :  
 $g(x) = 3 - 2x + x^2$
- a. Justifier, sans effectuer aucun calcul, que la fonction  $g$  est dérivable en 0.

- b. Donner la valeur du nombre dérivée de la fonction  $f$  en 0.
3. Soit  $h$  une fonction définie en 0 dont l'image de  $x$  est définie par :  
 $h(x) = \frac{-3x^3 + 3x^2 + x - 2}{x + 1}$
- a. Etablir l'égalité suivante :  $h(x) = 3x - 2 - \frac{3 \cdot x^3}{x + 1}$   
 b. En déduire l'équation de la tangente à la courbe  $\mathcal{C}_h$  au point d'abscisse 0.

### 4. Polynômes du second degré : fonctions dérivées :

#### Exercice 7648

Soit  $f$  une fonction du second degré définie par l'expression :  
 $f(x) = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$   
 où  $a$ ,  $b$  et  $c$  sont trois nombres réels avec  $a \neq 0$ .  
 On appelle la **fonction dérivée de la fonction  $f$** , la fonction  $f'$  définie par :  
 $f'(x) = 2a \cdot x + b$

Recopier et compléter le tableau ci-dessous afin d'obtenir l'expression de la fonction  $f'$  dérivée de la fonction  $f$  :

$f(x) = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$	$a$	$b$	$c$	$f'(x) = 2a \cdot x + b$
$-2 \cdot x^2 - x + 1$				
$0,25 \cdot x^2 + x - 1$				
$x^2 - x$				
$-4 \cdot x^2 - 2$				

#### Exercice 4667

Donner les dérivées des fonctions polynomiales suivantes :

1.  $f : x \mapsto -3x + 2$       2.  $g : x \mapsto 4x^2 - 4$   
 3.  $h : x \mapsto 2x^2 + 3x$       4.  $j : x \mapsto 5x - 2x^2$   
 5.  $k : x \mapsto -2x^2 + 2x$       6.  $\ell : x \mapsto (3x + 11)(4 - x)$

#### Exercice 4668

Donner les dérivées des fonctions polynomiales suivantes :

1.  $f : x \mapsto 3x + 2$       2.  $g : x \mapsto x^2 + 4$   
 3.  $h : x \mapsto x^2 + x$       4.  $j : x \mapsto x + 2x^2$   
 5.  $k : x \mapsto 3x^2 - 2x$       6.  $\ell : x \mapsto (x + 1)(2x - 4)$

### 5. Polynômes second degré : tangentes :

(+2 exercices pour les enseignants)

**Exercice 7650**

Soit  $f$  une fonction  $f$  dérivable en  $a$  et notons  $\mathcal{C}$  la courbe représentative de la fonction  $f$  dans un repère.

La tangente à la courbe  $\mathcal{C}$  au point d'abscisse  $a$  a pour équation réduite:


$$y = f'(a) \cdot (x - a) + f(a)$$

On considère la fonction  $f$  définie pour tout nombre  $x$  appartenant à l'intervalle  $[0; 7]$  par:

$$f(x) = -0,5 \cdot x^2 + 3,5 \cdot x - 3$$

On note  $\mathcal{C}_f$  la courbe représentative de la fonction  $f$  dans un repère et  $A$  le point d'abscisse 2 appartenant à  $\mathcal{C}_f$ .

1. Donner les coordonnées du point  $A$ .
2. Déterminer la valeur du nombre dérivée de la fonction  $f$  en  $x=2$ .
3. Déterminer l'équation réduite de la tangente  $(T)$  à la courbe  $\mathcal{C}_f$  au point  $A$ .
4. Tracer la tangente  $(T)$  dans le repère ci-dessous:

**Exercice 7651**


On considère la fonction  $f$  définie pour tout nombre  $x$  appartenant à l'intervalle  $[-2; 5]$  par:

$$f(x) = 0,25 \cdot x^2 - 0,75 \cdot x - 1$$

On note  $\mathcal{C}_f$  la courbe représentative de la fonction  $f$  dans un repère et  $A$  le point d'abscisse 2 appartenant à  $\mathcal{C}_f$ .

1. Donner les coordonnées du point  $A$ .

2. Déterminer la valeur du nombre dérivée de la fonction  $f$  en  $x=2$ .
3. Déterminer l'équation réduite de la tangente  $(T)$  à la courbe  $\mathcal{C}_f$  au point  $A$ .
4. Tracer la tangente  $(T)$  dans le repère ci-dessous:

**Exercice 7477**

On considère la fonction  $f$  définie par:

$$f(x) = 2 \cdot x^2 - 5 \cdot x + 4$$

On munit le plan d'un repère  $(O; I; J)$  et on note  $\mathcal{C}_f$  sa courbe représentative dans le plan.

1. Déterminer l'équation de la tangente  $(T)$  à la courbe  $\mathcal{C}_f$  au point d'abscisse  $\frac{1}{2}$ .
2. Vérifier le résultat précédent s à l'aide de la calculatrice

**Exercice 2312**

Soit  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par la relation:  $f(x) = 4 \cdot x^2 - 4 \cdot x - 3$

1. Calculer le nombre dérivé de la fonction  $f$  en 2.
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe  $\mathcal{C}_f$  au point d'abscisse 2.

**Exercice 2809**

On considère la fonction  $f$  polynomiale de degré 2 qui vérifie les deux conditions ci-dessous:

- L'ensemble des zéros de la fonction  $f$  est:  $\left\{-1; \frac{1}{2}\right\}$
- $f'(1) = 5$

Déterminer l'expression développée et réduite de la fonction  $f$ .

**6. Polynômes: tangentes :**


(+1 exercice pour les enseignants)

**Exercice 2845**

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par la relation:

$$f: x \mapsto \frac{x^4}{4} - x^3 + x^2 + x - 2$$

Voici la courbe représentative de la fonction  $f$  dans le repère  $(O; I; J)$ :



Nous allons montrer qu'il existe une droite  $(d)$  de coefficient directeur 1 qui est la tangente à la courbe  $\mathcal{C}_f$  en deux points distincts.

1. Résoudre l'équation:  $f'(x) = 1$

2. Déterminer l'équation réduite de la droite  $(d)$ .

**Exercice 4729**  

On considère la fonction  $f$  dont l'image d'un nombre réel  $x$

est donnée par :

$$f(x) = -x^4 + 2x^3 + 3x^2 - 5x - 3$$

Dans un repère  $(O; I; J)$ , on note  $\mathcal{C}_f$  la courbe représentative de la fonction  $f$  et  $(d)$  la droite d'équation :

$$y = -x + 1$$

Démontrer que la droite  $(d)$  est tangente à la courbe  $\mathcal{C}$  dont on précisera en deux points dont on précisera les coordonnées (on pourra conjecturer l'abscisse de ces points à l'aide de la calculatrice).

**7. Polynômes: problèmes autour des variations :**

(+2 exercices pour les enseignants)

**Exercice 4538**  

Soit  $f$  la fonction définie par la relation:  $f(x) = -x^3 + 2$

1. Résoudre l'équation:  $f(x) = 10$

2. Etablir que la fonction  $f$  est décroissante sur  $\mathbb{R}$

**Exercice 74**   

On considère un jeu de boules comme le jeu de pétanque par exemple. Un joueur lance une boule et on s'intéresse ici à la trajectoire de la boule.

Soit la fonction  $g$  définie sur l'intervalle  $[0; 2]$  par :

$$g(x) = -x^2 + 1,5 \cdot x + 1$$

Où :

- $x$  est le temps écoulé, en seconde, à partir de l'instant où la boule quitte la main du lanceur ;
- $g(x)$  représente, en mètres, la distance (verticale) séparant le sol de la boule après  $x$  secondes écoulées

1. La fonction  $g$  est représentée par une partie de la courbe donnée en annexe.

Repasser en couleur la courbe représentative ( $\mathcal{C}_g$ ) de la fonction  $g$  sur la feuille d'annexe.

2. a. Calculer  $g(0)$ . Décrire par une phrase ce que représente le point d'abscisse 0.

b. Calculer  $g(1)$ . Décrire par une phrase ce que représente le point d'abscisse 1.


3. Calculer  $g'(x)$ ,  $g'$  désignant la dérivée de la fonction  $g$ .

4. a. Rechercher le signe de  $g'(x)$  selon les valeurs de  $x$ ,  $x \in [0; 2]$ .

b. En déduire le tableau complet des variations de la fonction  $g$ .

c. En explicitant la méthode utilisée, indiquer à quel instant la boule atteint sa hauteur maximale.

d. En explicitant la méthode utilisée, indiquer à quel instant la boule touche le sol.



**Exercice 78**   

On considère la fonction  $f$  définie par :

$$f(x) = 54 \cdot (x^3 - 2 \cdot x^2 + x) \text{ sur l'intervalle } [0; 1].$$

1. a. Calculer  $f'(x)$  où  $f'$  est la fonction dérivée de la fonction  $f$  sur l'intervalle  $[0; 1]$ .

b. Vérifier que:  $f'(x) = 54 \cdot (3 \cdot x - 1)(x - 1)$  pour tout  $x$  de l'intervalle  $[0; 1]$ .

c. Etudier le signe de  $f'(x)$  sur l'intervalle  $[0; 1]$ .

2. Donner le maximum de  $f$  sur l'intervalle  $[0; 1]$ . Pour quelle valeur de  $x$  est-il atteint?

3. Recopier et compléter le tableau suivant par les valeurs de  $f(x)$  arrondies à 0,1 près.

$x$	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
$f(x)$		6,9								

4. Tracer la représentation graphique de la fonction  $f$  sur la feuille de papier millimétré jointe, en prenant pour unités graphiques 10 cm en abscisse et 1 cm en ordonnée.

**Exercice 6619**  

On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par la relation :

$$f(x) = a \cdot x^2 + b \cdot x + c \quad \text{où } a \in \mathbb{R}^* \text{ et } b, c \in \mathbb{R}.$$

Dans un repère  $(O; I; J)$  orthonormé, on note  $\mathcal{C}_f$  la courbe représentative de la fonction  $f$  et  $(\Delta)$  la tangente à la courbe  $\mathcal{C}_f$  au point d'abscisse 2.

1. Déterminer le coefficient directeur de la droite reliant les points de la courbe  $A$  et  $B$  de la courbe  $\mathcal{C}_f$  d'abscisses respectives 1 et 3.

2. a. Déterminer le nombre dérivée de la fonction  $f$  pour

$$x=2.$$

b. Quelle conclusion apportez-vous ?

## 8. Fonctions dérivées : racine carrée :

### Exercice 4687



Le tableau ci-dessous vous présente, pour chaque ligne, l'expression de l'image de  $x$  par une fonction et l'expression du nombre dérivé en  $x$  de cette fonction. Vérifier l'exactitude de l'expression du nombre dérivé en  $x$  :

Fonction	Image de $x$	Nombre dérivé en $x$
$f$	$x^3 - 5x^2 + x - 3$	$3x^2 - 10x + 1$
$g$	$\frac{2x-1}{x^2+x}$	$-\frac{2x^2-2x-1}{x^2(x+1)^2}$
$h$	$(x^2-3)\sqrt{x}$	$\frac{5x^2-3}{2\sqrt{x}}$
$j$	$\frac{3x-2}{2-x}$	$\frac{4}{(x-2)^2}$


### Exercice 4692



On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}_+$  par la relation :

$$f(x) = \sqrt{x} \cdot \left(\frac{1}{2}x - 1\right)$$

Dans le repère  $(O; I; J)$  orthonormé ci-dessous est donnée la courbe  $\mathcal{C}_f$  représentative de la fonction  $f$  :



1. On note  $f'$  la fonction dérivée de la fonction  $f$ . Etablir l'égalité suivante :

$$f'(x) = \frac{3x-2}{4\sqrt{x}}$$

2. a. Donner les coordonnées du point de  $\mathcal{C}_f$  ayant 4 pour abscisse.
- b. Donner la valeur du nombre dérivé de la fonction  $f$  en 4.
- c. Déterminer l'équation de la tangente  $(T)$  à la courbe  $\mathcal{C}_f$  au point d'abscisse 4.
- d. Tracer la tangente  $(T)$ .

### Exercice 8391



On munit le plan d'un repère  $(O; I; J)$  et on considère la fonction  $g$  définie par :

$$g(x) = \sqrt{x} \cdot (x-1)$$

On note  $\mathcal{C}_g$  sa courbe représentative dans le plan.

1. Déterminer l'équation de la tangente  $(d)$  à la courbe  $\mathcal{C}_g$  au point d'abscisse  $\frac{1}{4}$ .
2. Vérifier vos résultats à l'aide de la calculatrice

### Exercice 7652



On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}_+$  par :

$$f(x) = \sqrt{x-x}$$

1. Déterminer l'expression de la fonction dérivée  $f'$  de la fonction  $f$ .
2. a. Déterminer l'image et le nombre dérivé du nombre 2 par la fonction  $f$ .
- b. Déterminer l'expression de la tangente  $(T)$  à la courbe  $\mathcal{C}$  représentative de la fonction  $f$  au point d'abscisse 2.
3. a. Tracer la courbe  $\mathcal{C}$  et la tangente  $(T)$  à l'aide de votre calculatrice.
- b. Conjecturer la position relative de la courbe  $\mathcal{C}$  et de la tangente  $(T)$ .

## 9. Calculatrice et dérivée :

### Exercice 4642




1. On considère la fonction  $f$  dont l'image d'un nombre  $x$  réel est définie par la relation :

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x - 1$$

Voici deux captures d'écran de la représentation

graphique de cette fonction sur l'écran d'une calculatrice présentant le minimum et le maximum local de cette fonction :



Dresser, sans justification, le tableau de signes de la fonction dérivée  $f'$  de la fonction  $f$ .

2. A l'aide de la calculatrice et sans justification, dresser le tableau de signes associé aux dérivées des fonctions suivantes :

a.  $g(x) = -\frac{1}{3}x^3 + x^2 + 3x + 2$

b.  $h(x) = \frac{1}{3}x^3 + x^2 - 3x + 2$

c.  $j(x) = \frac{2}{3}x^3 + x^2 - 4x - 1$

d.  $k(x) = -\frac{4}{3}x^3 - 2x^2 + 1$

**Exercice 4643**



A l'aide de la calculatrice et sans justification, pour chacune des fonctions ci-dessous, dresser le tableau de signes de la fonction dérivée associée :

a.  $f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1}$

b.  $g(x) = \frac{4}{x^2 + 2x + 3}$

c.  $h(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x - 3}$

d.  $j(x) = \frac{x - 5}{-x^2 + 4x + 4}$

**Exercice 4518**



Répondre aux questions suivantes à l'aide de la calculatrice :

1. Soit  $f$  la fonction définie par :

$$f(x) = x^3 - 4x^2 + x + 2$$

Dresser le tableau de variations de la fonction  $f$  sur l'intervalle  $[-1; 4]$ .

2. On considère la fonction affine  $g$  définie par :

$$g(x) = -3x + 2$$

Déterminer les coordonnées des points d'intersection des courbes  $\mathcal{C}_f$  et  $\mathcal{C}_g$ .

**10. Produits :**

(+2 exercices pour les enseignants)

**Exercice 7147**



On considère les deux fonctions  $f$  et  $g$  définies ci-dessous par :

1.  $f(x) = (x^2 - 3)(2 - x^3)$

2.  $g(x) = (x^7 - 4x - 1)(x^3 + 2x)$

Déterminer les expressions de leur fonction dérivée.

**Exercice 8396**



1.  $f: x \mapsto (2x^2 - 1)(4x - 1)$     2.  $g: x \mapsto (5x^4 - x + 1)(3 - 2x^2)$

**11. Quotient :**

(+3 exercices pour les enseignants)

**Exercice 2349**



On considère les deux fonctions  $f$  et  $g$  par :

$$f(x) = (2x + 1)(3x^2 - x + 1) \quad ; \quad g(x) = \frac{2x + 5}{1 - 4x}$$

Déterminer l'expression de la fonction dérivée de chacune de ces deux fonctions.

**Exercice 94**



Déterminer l'expression des fonctions dérivées de chacune des fonctions ci-dessous :

a.  $f: x \mapsto \frac{2 - 2x}{5x + 1}$

b.  $g: x \mapsto (3x - 2)(2x^2 + 1)$

c.  $h: x \mapsto \frac{1}{3x + 1}$

d.  $j: x \mapsto (2x^2 + 3x) \cdot \sqrt{x}$

**12. Quotient et tangentes :**

(+2 exercices pour les enseignants)


**Exercice 4693**



On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}_+$  par la relation :

$$f(x) = \frac{5x - 2}{x^2 + 1}$$

Dans le repère  $(O; I; J)$  orthonormé ci-dessous est donnée la courbe  $\mathcal{C}_f$  représentative de la fonction  $f$  :



1. On note  $f'$  la fonction dérivée de la fonction  $f$ . Etablir l'égalité suivante:

$$f'(x) = \frac{-5 \cdot x^2 + 4 \cdot x + 5}{(x^2 + 1)^2}$$

2. a. Donner les coordonnées du point de  $\mathcal{C}_f$  ayant 1 pour abscisse.  
 b. Donner la valeur du nombre dérivée de la fonction  $f$  en 1.  
 c. Déterminer l'équation de la tangente ( $T$ ) à la courbe  $\mathcal{C}_f$  au point d'abscisse 1.  
 d. Tracer la tangente ( $T$ ).


**Exercice 6616**



On considère la fonction  $f$  définie par :

$$f(x) = \frac{4 \cdot x + 1}{x^2 + 2 \cdot x + 2}$$

On donne la représentation graphique  $\mathcal{C}_f$  de la fonction  $f$  dans le repère  $(O; I; J)$  orthonormé ci-dessous :



1. Etablir que la fonction  $f'$  dérivée de la fonction  $f$  admet pour expression :
- $$f'(x) = \frac{2 \cdot (1 - x) \cdot (2x + 3)}{(x^2 + 2 \cdot x + 2)^2}$$
2. a. Déterminer l'équation réduite de la tangente ( $\Delta$ ) à la courbe  $\mathcal{C}_f$  au point d'abscisse  $-1$ .  
 b. Tracer la droite ( $\Delta$ ) dans le repère ci-dessus.
3. Quelle particularité possède les tangentes à la courbe  $\mathcal{C}_f$  aux points d'abscisse  $-\frac{3}{2}$  et 1? Justifier votre réponse.

**13. Quotient et variations :**

(+4 exercices pour les enseignants)

**Exercice 4847**



On considère la fonction  $f$  dont l'image d'un nombre  $x$  est définie par la relation :

$$f(x) = \frac{3 \cdot x + 3}{x^2 + 3}$$

1. Dresser le tableau de signes de la fonction  $f$ .  
 2. Montrer que la fonction  $f'$  dérivée de la fonction  $f$  admet pour expression :
- $$f'(x) = \frac{-3 \cdot x^2 - 6 \cdot x + 9}{(x^2 + 3)^2}$$
3. a. Dresser le tableau de signes de la fonction  $f'$ .  
 b. Dresser le tableau de variations de la fonction  $f$ . (on indiquera les valeurs exactes des extrémums locaux)

**Exercice 4848**



On considère la fonction  $f$  dont l'image d'un nombre réel  $x$  est donnée par la relation :

$$f(x) = \frac{2 - x}{x^2 + 5}$$

1. Montrer que la fonction  $f'$  dérivée de la fonction  $f$  admet pour expression :
- $$f'(x) = \frac{x^2 - 4 \cdot x - 5}{(x^2 + 5)^2}$$
2. Dresser le tableau de signes de la fonction  $f'$   
 3. Dresser le tableau de variations de la fonction  $f$  (on

notera la valeur exacte des extrémums locaux).

**Exercice 4846**



On considère la fonction  $f$  définie par la relation :

$$f(x) = \frac{x^2 + 2 \cdot x + 1}{x - 1}$$

1. Déterminer l'ensemble de définition de la fonction  $f$ .  
 2. On note  $f'$  la fonction dérivée de la fonction  $f$ . Etablir l'égalité suivante :
- $$f'(x) = \frac{x^2 - 2 \cdot x - 3}{(x - 1)^2}$$
3. a. Etablir le tableau de signes de la fonction  $f'$  sur  $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ .  
 b. Dresser le tableau de variations de la fonction  $f$ . On indiquera la valeur exacte des deux extrémums locaux de cette fonction.
4. Dédurre de l'ensemble des questions précédentes le tableau de signes de la fonction  $f$ .


**Exercice 4841**



On considère la fonction  $f$  définie par la relation :

$$f(x) = \frac{3x + 3}{x^2 + 3}$$

Dans un repère  $(O; I; J)$  orthonormé, on donne la courbe  $\mathcal{C}_f$  représentative de la fonction  $f$  :



1. Justifier que la fonction  $f$  est définie sur  $\mathbb{R}$ .

2. A l'aide de sa représentation graphique, dresser le tableau de variations de la fonction  $f$  sur l'intervalle  $[-6; 3]$  (par lecture graphique, on utilisera des valeurs approchées).

3. a. Etablir l'expression suivante de la fonction  $f$  dérivée de la fonction  $f$ :

$$f'(x) = \frac{-3 \cdot x^2 - 6 \cdot x + 9}{(x^2 + 3)^2}$$

b. Etudier le tableau de signes de la fonction  $f'$  sur  $\mathbb{R}$ .

4. Quel conjecture peut-on faire entre le signe de la fonction dérivée  $f'$  et du sens de variation de la fonction  $f$ .


## 14. Révisions sur les dérivés :

(+3 exercices pour les enseignants)

### Exercice 3429



On considère une fonction  $f$  définie et dérivable sur l'intervalle  $[-2; 7]$  dont la courbe représentative  $\mathcal{C}_f$  est donnée ci-dessous :



Les tangentes à la courbe  $\mathcal{C}_f$ , aux points d'abscisses  $-1$ ,  $1$ ,  $5$  ont été tracées sur la représentation ci-dessus.

1. Déterminer le nombre dérivée de la fonction  $f$  en  $-1$  et en  $1$ .

2. Déterminer les équations des tangentes à la courbe  $\mathcal{C}_f$  aux points d'abscisses  $2$  et  $5$ .

### Exercice 3314



Déterminer l'expression des fonctions dérivées associées aux fonctions ci-dessous :

a.  $f(x) = -5x^3 + 2x - 2$       b.  $g(x) = \sqrt{x} \cdot (5x + 1)$

c.  $h(x) = \frac{3x - 1}{2 - x}$       d.  $j(x) = \frac{\sqrt{x}}{5 - 2x}$

### Exercice 3912



Il est possible que certains des résultats, à démontrer, ne soient pas lisibles sur l'écran de votre calculatrice graphique.

On considère la fonction  $f$  définie sur  $]0; 1[ \cup ]1; +\infty[$  par :

$$f(x) = \frac{10 \cdot (x - 8)}{x \cdot (x - 1)}$$

et on désigne par  $(\mathcal{C})$  sa courbe représentative relative à un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ .

1. a. Déterminer les limites de  $f$  en  $0$  et en  $+\infty$ .

b. Déterminer les limites de  $f$  quand  $x$  tend vers  $1$  par valeurs inférieures et quand  $x$  tend vers  $1$  par valeurs supérieures.

c. En déduire les asymptotes à la courbe  $(\mathcal{C})$ .

2. a. Déterminer la dérivée  $f'$  de la fonction  $f$ .

b. Montrer que  $f'(x)$  s'annule pour  $\alpha = 8 + 2\sqrt{14}$  et pour  $\beta = 8 - 2\sqrt{14}$ .

c. Dresser le tableau de variations de  $f$  (on indiquera les valeurs approchées au dixième près des extrémums locaux à l'aide de la calculatrice).

### Exercice 6803




Dans le plan muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ , on désigne par  $\mathcal{C}_u$  la courbe représentative de la fonction  $u$  définie sur l'intervalle  $]0; +\infty[$  par :

$$u(x) = a + \frac{b}{x} + \frac{c}{x^2}$$

où  $a$ ,  $b$  et  $c$  sont des réels fixés.

On a tracé sur le graphique ci-dessous la courbe  $\mathcal{C}_u$  et la droite  $\mathcal{D}$  d'équation  $y = 1$  :



On précise que la courbe  $\mathcal{C}_u$  passe par les points  $A(1; 0)$  et  $B(4; 0)$  et que l'axe des ordonnées et la droite  $\mathcal{D}$  sont asymptotes à la courbe  $\mathcal{C}_u$ .

1. a. Donner les valeurs de  $u(1)$  et  $u(4)$ .

b. Donner  $\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x)$ . En déduire la valeur de  $a$ .

c. En déduire que, pour tout réel  $x$  strictement positif :



$$u(x) = \frac{x^2 - 5x + 4}{x^2}$$

2. On suppose l'existence d'une fonction  $f$  définie sur l'intervalle  $]0; +\infty[$  vérifiant admettant pour dérivée la fonction  $u$  :  $f' = u$

Dresser le tableau de variations de la fonction  $f$ .  
(aucune valeur ne sera indiquée dans le tableau)

### Exercice 3312



Cet exercice est un questionnaire à choix multiples ; pour chacune des cinq questions, une et une seule affirmation est exacte.

Indiquer sur votre copie le numéro de la question et recopier l'affirmation exacte sans justifier votre choix.

**Barème :** A chaque question est attribué 1 point.

Une réponse inexacte enlève 0,5 point.

Une question sans réponse ne rapporte ni n'enlève aucun point.

Si le total des points est négatif, la note attribuée à l'exercice est ramenée à zéro.

Soit  $f$  la fonction définie sur  $]4; +\infty[$  par :

$$f(x) = -2x + 1 - \frac{8}{x-4}$$

et  $\Gamma$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé du plan.

1. Une autre expression de  $f(x)$  est :

a.  $f(x) = -2x + 1 - \frac{2}{x-1}$

b.  $f(x) = \frac{2x^2 - 9x + 12}{4-x}$

c.  $f(x) = \frac{2x^2 + 9x - 2}{x-4}$

2. Soit  $f'$  la fonction dérivée de  $f$  sur  $]4; +\infty[$ . Une expression de  $f'(x)$  est :

a.  $f'(x) = -2 - \frac{8}{(x-4)^2}$

b.  $f'(x) = \frac{(2-x)(x-6)}{(x-4)^2}$

c.  $f'(x) = \frac{-2x^2 + 16x - 24}{(x-4)^2}$

3. La courbe  $\Gamma$  admet pour asymptote :

a. la droite d'équation  $y=4$

b. la droite d'équation  $x=4$

c. la droite d'équation  $y=4x$


### Exercice 3509



On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par la relation :

$$f : x \mapsto \frac{3}{2}x^4 + 3x^3 - \frac{9}{2}x^2 - 5x + 6$$

On donne, ci-dessous, la courbe représentative de la fonction  $f$  dans un repère  $(O; I; J)$  :



La courbe  $\mathcal{C}_f$  représentative de cette fonction admet une droite  $(d)$  de coefficient directeur 1 comme tangente en deux points.

Déterminer l'équation de cette droite et les coordonnées de ces deux points.

## 15. Dérivabilité en un point :

(+1 exercice pour les enseignants)

### Exercice 3541



On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  de la manière suivante :

$$\begin{cases} f(x) = x^2 + 3x + 3 & \text{pour tout } x \in ]-\infty; -1] \\ f(x) = \frac{2}{x^2 + 1} & \text{pour tout } x \in ]-1; +\infty[ \end{cases}$$

1. a. Effectuer le tracé de la fonction  $f$  à l'aide de votre calculatrice.  
b. Faire une conjecture sur la continuité et sur la dérivabilité de la fonction  $f$ .

2. Justifier que la fonction  $f$  est continue en  $-1$ .

3. Justifier que la fonction  $f$  est dérivable en  $-1$ .

### Exercice 3600



### A - Etude d'une fonction :

On considère la fonction  $f$  définie par la relation :

$$f(x) = (x-1) \cdot \sqrt{x^2 - 1}$$

1. Déterminer l'ensemble de définition  $\mathcal{D}_f$  de la fonction  $f$ .

2. a. Etudier les deux limites suivantes :

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} ; \quad \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(-1+h) - f(-1)}{h}$$

- b. Etudier la dérivabilité de la fonction  $f$  en  $-1$  et en  $1$ .

3. a. Déterminer l'expression de la fonction  $f'$  dérivée de la fonction  $f$ .

- b. Dresser le tableau de variations de la fonction  $f$ .

### B - Prolongement par continuité :

On considère la fonction  $g$  définie sur  $\mathbb{R}$  de la manière suivante :

$$\begin{cases} g(x) = f(x) & \text{pour } x \in ]-\infty; -1[ \cup ]1; +\infty[ \\ g(x) = -x^3 + x^2 + x - 1 & \text{pour } x \in [-1; 1] \end{cases}$$

- Justifier que la fonction  $g$  est continue sur  $\mathbb{R}$ .
- Déterminer l'ensemble de dérivabilité de la fonction  $g$ .

## 255. Exercices non-classés :

### Exercice 77



Un rectangle  $ABCD$  a pour périmètre 10 cm.

#### Partie A

Dans cette partie, on pose  $AB = x$  (en cm)

- Dans quel intervalle fermé le réel  $x$  peut-il varier?
- Exprimer l'aire  $S(x)$  du rectangle  $ABCD$  en fonction de  $x$ .

#### Partie B

La fonction  $f$  est définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $f(x) = -x^2 + 5x$ .

- En faisant appel à sa fonction dérivée  $f'$ , dresser le tableau de variations de  $f$ .
- En déduire la valeur de  $x$  pour laquelle l'aire du rectangle  $ABCD$  est maximale.
- Dans le plan muni d'un repère orthonormé (unité : 2 cm sur chaque axe), tracer la courbe  $\mathcal{C}$  représentative de  $f$  sur l'intervalle  $[0; 5]$ .
  - Sur la même figure qu'au 3. a. tracer la tangente à la courbe  $\mathcal{C}$  en son point d'abscisse 1.

### Exercice 84



On veut résoudre, dans l'ensemble des nombres réels  $\mathbb{R}$ , l'équation :  $x^3 - 2x^2 - 4x + 5 = 0$ .

#### A - Méthode graphique


- Vérifier que le nombre 2 n'est pas solution de l'équation.
  - Montrer que, pour  $x \neq 2$ , l'équation  $x^2 = \frac{4x-5}{x-2}$  est équivalent à l'équation  $x^3 - 2x^2 - 4x + 5 = 0$
- Soit  $f$  la fonction définie pour tout réel  $x$  différent de 2 par  $f(x) = \frac{4x-5}{x-2}$ . Sa courbe représentative  $H$  dans un repère orthonormé est donnée en annexe à rendre avec la copie.
  - Par lecture graphique, indiquer le sens de variation de  $f$  sur chacun des intervalles  $] -\infty; 2[$  et  $] 2; +\infty[$ .
  - Déterminer la dérivée  $f'$  de  $f$  puis justifier le résultat lu dans la question précédente.
- Soit  $g$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $g(x) = x^2$ . Tracer sa courbe représentative  $P$  dans repère utilisé pour  $H$ .
- Par lecture graphique, déterminer le nombre de solutions dans  $\mathbb{R}$  de l'équation  $x^3 - 2x^2 - 4x + 5 = 0$ . Donner la valeur exacte ou une valeur approchée à  $10^{-1}$  près de chacune de ces solutions.

Justifier vos affirmations.

- Dresser le tableau de variations de la fonction  $g$ .
- Justifier l'existence d'un unique nombre  $\alpha$  appartenant à  $\mathbb{R}$  vérifiant les deux conditions suivantes :  $g(\alpha) = 2$  ;  $2 < \alpha < 2,1$

#### B - Méthode algébrique

- Vérifier que, pour tout réel :  $(x-1)(x^2 - x - 5) = x^3 - 2x^2 - 4x + 5$ .
- Soit  $h$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $h(x) = x^2 - x - 5$ .
  - Etudier le sens de variation de  $h$ .
  - Montrer que  $h\left(\frac{1}{2}\right)$  est la valeur minimum prise par  $h$ .
  - On pose :  $x = \frac{1}{2} + u$ . Exprimer  $h\left(\frac{1}{2} + u\right)$  en fonction de  $u$ ; factoriser l'expression obtenue.
  - En déduire les valeurs du réel  $x$  pour lesquelles  $h(x) = 0$ .
- Donner l'ensemble des solutions dans  $\mathbb{R}$  de l'équation :  $x^3 - 2x^2 - 4x + 5 = 0$ .



### Exercice 4881



Dans un repère, on note  $\mathcal{C}_f$  la courbe représentative de la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par la relation :

$$f(x) = x^3 - 2x^2 + 2x + 1$$

On note  $(T)$  la tangente à la courbe  $\mathcal{C}_f$  au point d'abscisse 1.

- Déterminer l'équation réduite de la droite  $(T)$ .
- Déterminer les coordonnées des points d'intersection de  $\mathcal{C}_f$  et de la droite  $(T)$ .