


# Hors programme lycée/Géométrie dans l'espace: produit scalaire et plan

## 1. Introduction (via les coordonnées) :

### Exercice 6647



Dans le plan muni d'un repère  $(O; I; J)$  orthonormé.




On considère les points  $A, B$  et  $C$  définis par :


$$A(-3; 1) ; B(4; -1) ; C(1; 3)$$

1. Déterminer les coordonnées du point  $I$  milieu du segment  $[BC]$ .
2. Soit  $J$  l'image du point  $A$  par la symétrie centrale de centre  $C$ .
  - a. Donner une relation vectorielle vérifiée par les points  $A, C$  et  $J$
  - b. Déterminer les coordonnées du point  $J$ .
3. Déterminer la norme du vecteur  $\overrightarrow{AB}$

### Exercice 6646



On considère le plan muni d'un repère  $(O; I; J)$  orthonormé.



1. On rappelle la formule de la distance entre deux points :

$$PQ = \sqrt{(x_Q - x_P)^2 + (y_Q - y_P)^2}$$

On considère les trois points du plan  $A, B$  et  $C$  de coordonnées :

$$A(-3; 2) ; B(-2; -2) ; C(2; -1)$$

- a. Déterminer les distances  $AB, AC$  et  $BC$ .
- b. Etablir que le triangle  $ABC$  est un triangle rectangle.

2. Soit  $\vec{u}(x; y)$  un vecteur, on définit la norme du vecteur  $\vec{u}$  comme le nombre  $\|\vec{u}\|$  défini par :

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

On considère les deux points  $E$  et  $F$  de coordonnées :


$$E(-1; 2) ; G(4; 3)$$

et les deux vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  de coordonnées :

$$\vec{u}(4; -1) ; \vec{v}(1; 2)$$

- a. Déterminer les normes des vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$ .
- b. Déterminer les coordonnées des points  $F$  et  $H$  vérifiant les deux égalités vectorielles :
 
$$\overrightarrow{EF} = \vec{u} ; \overrightarrow{HG} = \vec{v}$$
- c. Exprimer le vecteur  $\vec{u} + \vec{v}$  à l'aide des points  $E, F$  et  $G$ ?
- d. Le triangle  $EFG$  est-il rectangle?

### Exercice 2572




On considère le plan muni du repère orthonormé  $(O; I; J)$  et trois points  $A, B, C$  du plan.

On ne connaît pas les coordonnées des points  $A$  et  $B$  mais on note :

$$\overrightarrow{AB}(x; y) ; \overrightarrow{BC}(x'; y')$$

1. Déterminer les coordonnées du vecteur  $\overrightarrow{AC}$ .
2. Exprimer la longueur de chacun des vecteurs  $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{AC}$  en fonction de  $x, x', y, y'$ . Elles se notent respectivement  $\|\overrightarrow{AB}\|, \|\overrightarrow{BC}\|, \|\overrightarrow{AC}\|$ .
3. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que les droites  $(AB)$  et  $(BC)$  soient perpendiculaires.



## 2. Produit scalaire et coordonnées :

### Exercice 4091



Dans l'espace muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ , on donne les points :

$$A(2; 1; 3) \quad ; \quad B(-3; -1; 7) \quad ; \quad C(3; 2; 4)$$

1. Déterminer les coordonnées du point  $H$  barycentre du système :

$$\{(A; -2); (B; -1); (C; 2)\}$$

2. Déterminer la nature de l'ensemble  $\Gamma_1$ , des points  $M$  de l'espace tels que :

$$(-2\vec{MA} - \vec{MB} + 2\vec{MC}) \cdot (\vec{MB} - \vec{MC}) = 0$$

En préciser les éléments caractéristiques.

3. Déterminer la nature de l'ensemble  $\Gamma_2$ , des points  $M$  de l'espace tels que :

$$\| -2\vec{MA} - \vec{MB} + 2\vec{MC} \| = \sqrt{29}$$

En préciser les éléments caractéristiques.

## 3. Ensemble de points :

### Exercice 4104



On considère deux points  $A$  et  $D$  de l'espace et on désigne par  $I$  le milieu du segment  $[AD]$ .

1. Démontrer que, pour tout point  $M$  de l'espace :

$$\vec{MD} \cdot \vec{MA} = MI^2 - IA^2$$

2. En déduire l'ensemble  $(E)$  des points  $M$  de l'espace, tels que :

$$\vec{MD} \cdot \vec{MA} = 0$$

### Exercice 4107



Soit  $A$  et  $B$  deux points distincts du plan.

1. Caractériser l'ensemble des points tels que :

a.  $\vec{AB} \cdot \vec{AM} = 0$

b.  $\vec{AB} \cdot \vec{AM} = AB^2$

c.  $\vec{AB} \cdot \vec{AM} = -AB^2$

2. On suppose que  $AB=6$ . Caractériser l'ensemble des points tels que :

a.  $\vec{AB} \cdot \vec{AM} = 18$

b.  $\vec{AB} \cdot \vec{AM} = -1$

### Exercice 4109



Dans l'espace, on considère deux points  $A$  et  $B$  distincts tels que  $AB=4$ . On note  $I$  le milieu du segment  $[AB]$  :

1. Démontrer que pour tout point  $M$  de l'espace, on a l'égalité :

$$MA^2 - MB^2 = 2 \cdot \vec{IM} \cdot \vec{AB}$$

2. Déterminer l'ensemble des points  $M$  vérifiant :

$$MA^2 - MB^2 = 16$$