Hors programme lycée/Valeurs absolues

2. Fonctions affines par morceaux :
(+1 exercice pour les enseignants)

Exercice 420

Tracer dans le repère ci-dessous la courbe représentative de la fonction suivante :

$$f:\begin{cases} f(x)=2x+8 & \text{si } x\in[-5\,;-2] \\ f(x)=-0.5x+3 & \text{si } x\in]-2\,;2] \\ f(x)=-2x+6 & \text{si } x\in]2\,;4] \end{cases}$$



Exercice 3000

Dans le plan, on considère le rectangle $ABCD$ de longueur $5\,cm$ et de largeur $3\,cm$. Un point M parcourt le contour de ce rectangle ; on repère ce point par le nombre x représentant la distance parcourue par ce point en partant de A et en parcourant le rectangle dans le sens direct.



On note $\mathcal{A}(x)$ l'aire de la partie hachurée lorsque M est repéré par le nombre x.

1. Justifier que la fonction $\mathcal{A}$ est une fonction affine par morceaux en fonction de x définie par le système :

$$\begin{cases} x & \text{pour } x\in[0\,;6] \\ \dfrac{3}{2}x-3 & \text{pour } x\in[6\,;10] \\ x+2 & \text{pour } x\in[10\,;16] \\ \dfrac{3}{2}\cdot x-6 & \text{pour } x\in[16\,;20] \end{cases}$$

2. Déterminer la valeur de x pour laquelle on a : $\mathcal{A}(x)=20\,cm^2$

4. Valeur absolue - équation :
(+1 exercice pour les enseignants)

Exercice 8127

1. Compléter le tableau de valeurs ci-dessous :

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$x+1$							
$2\cdot x-1$							

2. Parmi les valeurs étudiées dans la question précédente, existe-t-il des solutions de l'équation :
$|x+1|=|2x-1|$

Exercice 323

Résoudre les équations suivantes :

a. $|2-x|=2{,}5$ b. $|x+100|=1$

c. $3\times|x+2|=1$ d. $|2-x|\times2=1$

e. $3\times|x+5|+3=9$ f. $2\times|2-x|+4=1$

Exercice 339

Résoudre les équations suivantes :

a. $|2x-1|=|-x+1|$ b. $|3x-1|=|3x+1|$

c. $|x-2|=5$ d. $|x+2|=6$

Exercice 7302

On considère les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par les relations :
$f(x)=x-|2\cdot x-1|$; $g(x)=x-2$

On note $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$ respectivement les courbes représentatives des fonctions f et g.

1. A l'aide de la calculatrice, déterminer les abscisses des points d'intersection des courbes $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$.

2. a. Etablir l'équivalence :
$f(x)=g(x) \iff |2\cdot x-1|=|2|$

   b. En déduire les coordonnées des points d'intersection des courbes $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$.

5. Valeur absolue - un peu plus loin : *(+2 exercices pour les enseignants)*

Exercice 303

Résoudre les équations suivantes :

a. $\left|x+3\right| - \left|2x+1\right| = 2$ b. $\left|x\right| + 3\cdot\left|4x-1\right| = x+1$

Exercice 302

On considère les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par :

$f(x) = \left|x+2\right|$; $g(x) = \left|x\right| - 1$

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O\,;I\,;J)$, on note $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$ les courbes représentatives respectives des fonctions f et g :



1. a. Tracer la courbe $\mathscr{C}_f$ dans le repère ci-dessus.
   b. Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) \geqslant 1$.
2. a. Tracer la courbe $\mathscr{C}_g$ dans le repère ci-dessus.
   b. Résoudre graphiquement l'inéquation $g(x) \leqslant 0$.

Exercice 324

On considère l'équation (E) définie par :

(E) : $\left|x+1\right| + \left|x-1\right| \leqslant 5$

On considère les trois intervalles suivants :

$I =]-\infty\,;-1]$; $J = [-1\,;1]$; $K = [1\,;+\infty[$

1. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :
   $f : x \longmapsto \left|x+1\right| + \left|x-1\right|$

   Simplifier l'expression de la fonction f sur chacun des trois intervalles I, J et K.
2. a. Résoudre l'inéquation (E) sur chacun des trois intervalles I, J et K.
   b. Donner l'ensemble des solutions de l'équation (E).

6. Valeur absolue - étude de fonctions H : *(+2 exercices pour les enseignants)*

Exercice 2301

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = -\frac{1}{4}\cdot\left|x+2\right| + \frac{3}{4}\cdot\left|x-4\right|$$

1. a. Simplifier chaque expression en fonction de l'intervalle étudié :

x	$-\infty$ $\quad$ -2	4	$+\infty$
$\left\|x+2\right\|$			
$\left\|x-4\right\|$			

   b. Donner l'expression simplifiée de la fonction f sur chacun des trois intervalles suivants :
   $I =]-\infty\,;-2]$; $J = [-2\,;4]$; $K = [4\,;+\infty[$
2. On munit le plan d'un repère $(O\,;I\,;J)$ orthonormé donné ci-dessous :



3. D'après la représentation graphique, tracer le tableau de variations de la fonction f.

Exercice 290

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par la relation :

$$f(x) = \left|x+1\right| - \frac{1}{2}\cdot x$$

1. Simplifier l'écriture des expressions algébriques sur les intervalles $]-\infty\,;-1]$ et $[-1\,;+\infty[$ dans le tableau ci-dessous :

x	$-\infty$ $\quad\quad\quad\quad$ -1 $\quad\quad\quad\quad$ $+\infty$	
$\lvert x+1\rvert$		
$f(x)$		

2. Dans le plan muni d'un repère $(O;I;J)$ orthonormé, sont les deux courbes $\mathscr{C}_1$ et $\mathscr{C}_2$. Laquelle de ces deux courbes est la représentation de la fonction f :



Exercice 326

On considère la fonction f définie par la relation :

$$f(x) = \left|\frac{1}{2}\cdot x+\frac{1}{2}\right| - \left|\frac{1}{4}\cdot x-\frac{1}{2}\right|$$

1. Simplifier les expressions algébriques sur les trois intervalles $]-\infty;-1]$, $[-1;2]$ et $[2;+\infty[$ dans le tableau ci-dessous :

x	$-\infty$ $\quad\quad$ -1	$\quad\quad$ 2	$\quad\quad$ $+\infty$
$\left\lvert\frac{1}{2}\cdot x+\frac{1}{2}\right\rvert$			
$\left\lvert\frac{1}{4}\cdot x-\frac{1}{2}\right\rvert$			
$f(x)$			

2. Dans un repère orthonormé, des courbes sont représentées ci-dessous :





a. Par lecture graphique et sans justification, donner les équations réduites des droites (d_1), (d_2) et (d_3).

b. Parmi les courbes $\mathscr{C}_1$, $\mathscr{C}_2$ et $\mathscr{C}_3$, quelle est la représentation de la fonction f?

Exercice 5032

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ dont l'image d'un nombre x est donnée par la relation :

$$f(x) = \left|\frac{3}{4}\cdot x-\frac{3}{2}\right| - \left|\frac{1}{2}\cdot x+\frac{1}{2}\right|$$

1. Déterminer l'image de -4 et de 0 par la fonction f.

2. Simplifier l'expression de la fonction f sur chacun des trois intervalles ci-dessous :

$I=]-\infty;-1]$; $J=[-1;2]$; $K=[2;+\infty[$

3. On munit le plan du repère $(O;I;J)$ ci-dessous. Effectuer dans ce repère le tracé de la courbe $\mathscr{C}_f$ représentative de la fonction f.



4. **a.** Graphiquement et sans justification, donner l'ensemble des solutions de l'équation $f(x)=-1$.

b. Algébriquement, justifier que l'équation $f(x)=-1$ n'admet aucune solution sur l'intervalle $]-\infty;-1[$.

7. Un peu plus loin - propriétés algébriques de la valeur absolue :

Exercice 5015

On souhaite établir l'égalité suivante pour tous nombres réels x et y :

$$|x\times y| = |x|\times|y|$$

Pour cela, on raisonne par disjonction de cas sur la valeur de x et sur la valeur de y. Etablir cette relation dans chacun des cas suivant :

a. $x\in\mathbb{R}_+$ et $y\in\mathbb{R}_+$ $\quad$ **b.** $x\in\mathbb{R}_+$ et $y\in\mathbb{R}_-$

c. $x\in\mathbb{R}_-$ et $y\in\mathbb{R}_+$ $\quad$ **d.** $x\in\mathbb{R}_-$ et $y\in\mathbb{R}_-$

Exercice 5016

1. Pour tout nombres réels x et y, établir l'inégalité :

$$|x+y|^2 \leqslant \big(|x|+|y|\big)^2$$

2. En déduire, pour tout réels x et y, la comparaison suivante :

$$|x+y| \leqslant |x|+|y|$$

255. Exercices non-classés : *(+5 exercices pour les enseignants)*

Exercice 1911

Traduire les équations ou inéquations suivantes en termes de distance, puis les résoudre :

a. $|x-2| = 1{,}5$ b. $|x+1| = 1$ c. $|2x-1| = 3$

d. $|x-3| \leqslant 2$ e. $|x+4| \leqslant 1$ f. $|x-3| \geqslant 1$

