

# Term Spécialité/Représentation, équation cartésienne

## 1. Résolution de systèmes :

### Exercice 6348



Résoudre le système suivant :

$$\begin{cases} x + 2y - z = -2 \\ 3x + y + 2z = -1 \\ x - y + 3z = 3 \end{cases}$$

(On montrera que ce système admet un unique triplet solution).

### Exercice 8653



Résoudre le système suivant :

$$\begin{cases} 3x + y - z = 1 \\ x - y + 2z = 2 \\ -x + 5y - 9z = -5 \end{cases}$$

(On montrera que ce système n'admet aucune solution)

### Exercice 8654



Résoudre le système suivant :

$$\begin{cases} x + y - z = 5 \\ 2x - y + 4z = -2 \\ 5x - y + 7z = 1 \end{cases}$$

(On montrera que ce système admet une infinité de solution qu'on écrira sous la forme  $(\dots; \dots; z)$  où  $z \in \mathbb{R}$ )

## 2. Représentations paramétriques d'une droite :

### Exercice 5400



Donner une représentation paramétrique de la droite  $(d)$  passant par le point  $A$  et admettant le vecteur  $\vec{u}$  pour vecteur directeur dans chaque cas ci-dessous :

a.  $A(3; 0; -2)$  ;  $\vec{u}(-1; -2; 1)$

b.  $A(2; -1; 1)$  ;  $\vec{u}(2; 0; -4)$

### Exercice 4038



L'espace est muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ .

On considère le point  $A$  de coordonnées  $(-2; 8; 4)$  et le vecteur  $\vec{u}$  de coordonnées  $(1; 5; -1)$ .

Déterminer une représentation paramétrique de la droite  $(d)$  passant par  $A$  et de vecteur directeur  $\vec{u}$ .

### Exercice 4035



Indiquer pour la proposition suivante si elle est vraie ou fausse en justifiant la réponse.

L'espace est rapporté au repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ .

La droite de l'espace passant par le point  $B$  de coordonnées  $(2; 3; 4)$  et admettant le vecteur  $\vec{u}(1; 2; 3)$  comme vecteur directeur a pour représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = t + 1 \\ y = 2t + 1 \\ z = 3t + 1 \end{cases} \text{ où } t \in \mathbb{R}$$

## 3. Représentations paramétriques de droites et positions relatives :

(+1 exercice pour les enseignants)

### Exercice 6347



On considère l'espace muni d'un repère  $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$  et la droite  $(d)$  admettant la représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = -1 + t \\ y = 1 + 2t \\ z = 2 - 3t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

1. a. Montrer que le point  $A\left(\frac{1}{2}; 4; -\frac{5}{2}\right)$  appartient à la droite  $(d)$ .

b. Montrer que le point  $B\left(-\frac{9}{4}; \frac{3}{2}; -\frac{23}{4}\right)$  n'appartient

pas à la droite  $(d)$ .

2. On considère la droite  $(d')$  admettant la représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = 1 + \frac{3}{2}t \\ y = 3 - 3t \\ z = -4 - \frac{9}{2}t \end{cases}, \text{ où } t \in \mathbb{R}$$

a. Montrer que le point  $A$  appartient à la droite  $(d')$ .

b. Quelle est la position relative des droites  $(d)$  et  $(d')$ ?

**Exercice 5401**  

On considère l'espace muni d'un repère  $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$  et les deux droites  $(d)$  et  $(d')$  admettant pour représentations paramétriques :

$$(d) : \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -1 - 2t \\ z = 2 + 6t \end{cases} \quad (d') : \begin{cases} x = -1 - t \\ y = -1 + t \\ z = -3t \end{cases} \quad \text{où } t \in \mathbb{R}$$

1. Montrer que les droites  $(d)$  et  $(d')$  sont parallèles.
2. Montrer que les droites  $(d)$  et  $(d')$  sont parallèles-strictes?  
(on montrera qu'un point de  $(d)$  n'appartient pas à  $(d')$ )

**Exercice 4057**   

L'espace est rapporté à un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ . Soit  $A$  le point de coordonnées  $(3; 1; 3)$ .

On considère la droite  $\mathcal{D}$  de l'espace passant par  $A$  et de vecteur directeur  $\vec{u}(1; 2; -1)$  et la droite  $\mathcal{D}'$  d'équations

paramétriques :

$$\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 3 + t \\ z = t \end{cases} \quad \text{où } t \in \mathbb{R}$$

Dire laquelle des trois affirmations suivantes est exacte. Aucune justification n'est demandée :

1. Les droites  $\mathcal{D}$  et  $\mathcal{D}'$  sont coplanaires et parallèles ;
2. Les droites  $\mathcal{D}$  et  $\mathcal{D}'$  sont coplanaires et sécantes ;
3. Les droites  $\mathcal{D}$  et  $\mathcal{D}'$  sont non coplanaires.

**Exercice 4067**   

On considère les deux droites  $(d)$  et  $(d')$  dont les représentations paramétriques sont respectivement :

$$\begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = 1 - 2t \\ z = -3 + t \end{cases} \quad \text{où } t \in \mathbb{R} \quad \begin{cases} x = 5 - 2k \\ y = -1 + k \\ z = 2 - \frac{1}{2}k \end{cases} \quad \text{où } k \in \mathbb{R}.$$

Montrer que les droites  $(d)$  et  $(d')$  sont coplanaires.

#### 4. Représentations paramétriques d'une droite et résolution de systèmes : (+1 exercice pour les en

**Exercice 5402**  

On considère l'espace muni d'un repère  $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$  et les deux droites  $(d)$  et  $(d')$  admettant pour représentation paramétrique :

$$(d) : \begin{cases} x = -t \\ y = -1 - t \\ z = 5 + 3t \end{cases} ; t \in \mathbb{R} \quad (d') : \begin{cases} x = 4 + t \\ y = 3 + t \\ z = -1 \end{cases} ; t \in \mathbb{R}$$

Montrer que les droites  $(d)$  et  $(d')$  sont coplanaires et sécantes. On précisera les coordonnées du point d'intersection.

**Exercice 5409**  

Dans l'espace muni d'un repère  $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ , on considère les deux droites  $(d)$  et  $(d')$  admettant pour représentations paramétriques :

$$(d) : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + 3t \\ z = -t \end{cases} , t \in \mathbb{R} \quad (d') : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -6 - 2t \\ z = 3 + t \end{cases} , t \in \mathbb{R}$$

Montrer que les droites  $(d)$  et  $(d')$  sont sécantes et déterminer les coordonnées de leur point d'intersection.

**Exercice 5403**  

On considère l'espace muni d'un repère  $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$  et les deux droites  $(d)$  et  $(d')$  admettant pour représentation paramétrique :

$$(d) : \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 1 + t \\ z = 2 + t \end{cases} \quad \text{où } t \in \mathbb{R} \quad (d') : \begin{cases} x = -2 - t \\ y = -1 - t \\ z = -1 + t \end{cases} \quad \text{où } t \in \mathbb{R}$$

Justifier que ces deux droites sont non-coplanaires.

**Exercice 4066**   

On considère les deux droites de représentation paramétriques respectives :

$$\begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = 1 + t \\ z = -3 + 2t \end{cases} \quad \text{où } t \in \mathbb{R} \quad \begin{cases} x = 7 + 2u \\ y = 2 + 2u \\ z = -6 - u \end{cases} \quad \text{où } u \in \mathbb{R}$$

Montrer que ces deux droites sont sécantes. Donner les coordonnées du point d'intersection.

**Exercice 4065**   

L'espace est muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ .

On considère les droites  $(d)$  et  $(d')$  admettant respectivement les représentations paramétriques suivantes :

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 - 3t \\ z = -1 - t \end{cases} \quad \text{où } t \in \mathbb{R} \quad \begin{cases} x = 2 - k \\ y = 1 + 2k \\ z = k \end{cases} \quad \text{où } k \in \mathbb{R}.$$

Montrer que les droites  $(d)$  et  $(d')$  ne sont pas coplanaires.

**Exercice 8655**  

On considère les droites  $(\Delta)$  et  $(\Delta')$  dont les représentations paramétriques sont respectivement :

$$\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -3 - t \\ z = 6 + 3t \end{cases} \quad \text{où } t \in \mathbb{R} \quad \begin{cases} x = -1 - k \\ y = 2 + 2k \\ z = 1 - k \end{cases} \quad \text{où } k \in \mathbb{R}.$$

Montrer que les droites  $(\Delta)$  et  $(\Delta')$  sont coplanaires.

#### 5. Représentations paramétriques de droites et orthogonalités : (+1 exercice pour les enseignants)

**Exercice 5414**  

Dans l'espace muni d'un repère  $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$  orthonormé, on considère les deux droites  $(d)$  et  $(d')$  définies par leur représentation paramétrique :

$$(d) \begin{cases} x = -3 + 2t \\ y = -4 + 3t \\ z = 3 - t \end{cases} \text{ où } t \in \mathbb{R} \quad (d') \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -3 - 2t \\ z = -2t \end{cases} \text{ où } t \in \mathbb{R}$$

1. Montrer que les droites  $(d)$  et  $(d')$  sont orthogonales entre elles.
2. Les droites  $(d)$  et  $(d')$  sont-elles sécantes? Si oui, préciser le point d'intersection.

**Exercice 6968**  

Dans l'espace muni d'un repère  $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$  orthonormé, on considère deux droites  $(d)$  et  $(d')$  admettant pour représentation paramétrique :

$$(d) \begin{cases} x = -3 + 2t \\ y = -t \\ z = -1 + t \end{cases} \text{ } t \in \mathbb{R} \quad ; \quad (d') \begin{cases} x = -1 - 2t \\ y = 1 + 3t \\ z = -t \end{cases} \text{ } t \in \mathbb{R}$$

1. Montrer que les droites  $(d)$  et  $(d')$  sont sécantes. On déterminera les coordonnées de leur point  $M$  d'intersection.
2. a. On considère les deux vecteurs  $\vec{u}(2; -1; 1)$  et  $\vec{v}(-2; 3; -1)$ . Déterminer les coordonnées d'un vecteur  $\vec{n}$  qui soit orthogonal aux deux vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$ .  
b. En déduire une représentation paramétrique de la droite  $(\Delta)$  passant par le point  $M$  et orthogonale aux deux droites  $(d)$  et  $(d')$ .

**Exercice 6405**   

On considère l'espace muni d'un repère  $(O; I; J; K)$  et les deux droites  $(d)$  et  $(d')$  admettant pour équation paramétrique :

$$(d) \begin{cases} x = 3 + t \\ y = -5 + t \\ z = 4 \end{cases} \text{ où } t \in \mathbb{R} \quad ; \quad (d') \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 3 + t \\ z = -2 - t \end{cases} \text{ où } t \in \mathbb{R}$$

1. Montrer que les droites  $(d)$  et  $(d')$  sont non-coplanaires.
2. On suppose l'existence d'une droite  $(\Delta)$  perpendiculaire à la droite  $(d)$  et perpendiculaire à la droite  $(d')$ 
  - a. Justifier l'existence d'un réel  $t$  tel que la droite  $(\Delta)$  admette pour représentation paramétrique :
 
$$\begin{cases} x = 3 + t + t' \\ y = -5 + t - t' \\ z = 4 + t' \end{cases} \text{ où } t' \in \mathbb{R}$$
  - b. En déduire une équation paramétrique de la droite  $(\Delta)$ .

**Exercice 4036**   

L'espace est rapporté au repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ .

On note  $\mathcal{D}$  la droite des abscisses et  $\mathcal{D}'$ , la droite de représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = -t \\ y = 3 + 3t \\ z = 1 - t \end{cases}$$

1. Justifier que les droites  $\mathcal{D}$  et  $\mathcal{D}'$  ne sont pas coplanaires.
2. On considère la droite  $\Delta$  perpendiculaire commune à  $\mathcal{D}$  et  $\mathcal{D}'$ . Prouver qu'il existe deux réels  $b$  et  $c$  tels que le vecteur  $\vec{w} = b \cdot \vec{j} + c \cdot \vec{k}$  soit un vecteur directeur de  $\Delta$ .

**6. Représentations paramétriques d'un plan :****Exercice 5424**  

Dans l'espace muni d'un repère  $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ , on considère les trois points :

$$A(2; 0; -1) \quad ; \quad B(1; 0; 3) \quad ; \quad C(2; 1; 1)$$

1. Justifier que les points  $A$ ,  $B$  et  $C$  définissent un plan.
2. En choisissant  $(\vec{AB}; \vec{AC})$  comme couple de vecteurs directeurs, montrer que le plan  $(ABC)$  admet pour représentation paramétrique le système suivant :

$$\begin{cases} x = -t + 2 \\ y = t' \\ z = 4t + 2t' - 1 \end{cases} \text{ où } t \in \mathbb{R}, t' \in \mathbb{R}$$

3. Justifier que le point  $D(1; -2; -1)$  appartient au plan  $(ABC)$ .

**Exercice 5425**  

Dans l'espace muni d'un repère  $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ , on considère les trois points :

$$A(3; -1; 2) \quad ; \quad B(3; 1; 1) \quad ; \quad C(2; -1; 1)$$

1. Justifier que les points  $A$ ,  $B$  et  $C$  définissent un plan.
2. Déterminer une représentation paramétrique du plan  $(ABC)$ .

**Exercice 6350**  

Dans l'espace muni d'un repère  $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ , on considère les trois points :

$$A(2; 0; -1) \quad ; \quad B(1; 2; 2) \quad ; \quad C(-1; 1; -2)$$

1. a. Les points  $A$ ,  $B$ ,  $C$  déterminent-ils un plan? Justifier votre réponse.  
b. Déterminer une représentation paramétrique du plan  $(ABC)$ .
2. a. On considère le point  $D(0; 3; 1)$ . Le point  $D$  appartient-il au plan  $(ABC)$ ? Justifier votre réponse.  
b. On considère le point  $E(7; 0; 4)$ . Le point  $E$  appartient-il au plan  $(ABC)$ ? Justifier votre réponse.

## 7. Coplanarité :

### Exercice 6945



1. On considère les trois vecteurs :  
 $\vec{u}(1; -1; 2)$  ;  $\vec{v}(1; 1; 3)$  ;  $\vec{w}(-1; -9; -7)$   
 Montrer que les vecteurs  $\vec{u}$ ,  $\vec{v}$ ,  $\vec{w}$  sont coplanaires.

2. On considère les trois vecteurs :  
 $\vec{u}(2; -2; 1)$  ;  $\vec{v}(1; 4; -2)$  ;  $\vec{w}(1; -16; 6)$   
 Montrer que les vecteurs  $\vec{u}$ ,  $\vec{v}$ ,  $\vec{w}$  ne sont pas coplanaires.

### Exercice 6947



On considère l'espace muni d'un repère. Dans chacun des cas et sans justification, donner la relation  $\vec{w} = \alpha \cdot \vec{u} + \beta \cdot \vec{v}$  justifiant la coplanarité des vecteurs  $\vec{u}$ ,  $\vec{v}$ ,  $\vec{w}$ .

1.  $\vec{u}(3; 2; 0)$  ;  $\vec{v}(1; 0; 1)$  ;  $\vec{w}(7; 6; -2)$   
 2.  $\vec{u}(1; 0; -1)$  ;  $\vec{v}(3; -1; 2)$  ;  $\vec{w}(1; -1; 4)$

### Exercice 2780



Au fil de cet exercice, nous considérons les deux systèmes suivants de trois équations à trois inconnues :

$$(S) : \begin{cases} 5a - 2b + 3c = 0 \\ -a + 3b + 2c = 0 \\ -a + b - c = 0 \end{cases}$$

$$(T) : \begin{cases} -2a + b - 5c = 0 \\ a - 3b - 5c = 0 \\ 5a - 2b + 14c = 0 \end{cases}$$

On se place dans un repère  $(O; I; J; K)$  pour étudier la coplanarité de vecteurs dans l'espace :

1. a. Montrer que le système  $(S)$  n'admet que le triplet  $(0; 0; 0)$  pour solution.  
 b. En déduire que les vecteurs :  
 $\vec{p}(5; -1; -1)$  ;  $\vec{q}(-2; 3; 1)$  ;  $\vec{s}(11; 2; -1)$   
 sont non-coplanaires.

2. On considère les trois vecteurs suivants :  
 $\vec{u}(-2; 1; 5)$  ;  $\vec{v}(1; -3; -2)$  ;  $\vec{w}(-5; -5; 14)$   
 a. Justifier que la coplanarité de ces trois vecteurs est équivalente à la condition :  
 $\mathcal{S}_{(T)} \neq \{(0; 0; 0)\}$   
 b. En déduire que les trois vecteurs  $\vec{u}$ ,  $\vec{v}$ ,  $\vec{w}$  sont coplanaires.

### Exercice 2791



On munit l'espace d'un repère  $(O; I; J; K)$  :

1. On considère les quatre points suivants :  
 $A(-5; -2; 3)$  ;  $B(0; 0; 6)$   
 $C(-7; -1; 7)$  ;  $D(-21; -3; 9)$   
 Montrer que les points  $A, B, C, D$  sont coplanaires.  
 2. On considère les 5 points suivants :  
 $E(-2; 1; -1)$  ;  $F(-4; 3; -2)$   
 $G(-3; 4; -4)$  ;  $H(-5; 6; 2)$  ;  $L(-11; 8; 5)$   
 Montrer que la droite  $(HL)$  n'est pas parallèle au plan  $(EFG)$ .

### Exercice 2800



Dans l'espace muni d'un repère  $(O; I; J; K)$ , on considère les quatre points suivants :

$$A(5; -4; 3) ; B(7; -5; 6)$$

$$C(10; -2; 1) ; D(-11; -14; 17)$$

Montrer que les points  $A, B, C, D$  sont coplanaires.

### Exercice 2815



On considère dans l'espace muni d'un repère les deux vecteurs suivants définis par leurs coordonnées :

$$\vec{u} = (3; 2; 1) ; \vec{v} = (-1; 3; 1)$$

On considère le vecteur  $\vec{w}$  défini en fonction de  $x$  un nombre réel par ses coordonnées :

$$\vec{w}(2; 16; x)$$

Déterminer le(s) valeur(s) de  $x$  tel(les) que les vecteurs  $\vec{u}$ ,  $\vec{v}$ ,  $\vec{w}$  sont colinéaires.

### Exercice 5437



Dans l'espace muni d'un repère  $(O; I; J; K)$  orthonormé, on considère quatre points repérés par leurs coordonnées :

$$A(3; -1; 5) ; B(-2; 2; 3) ; C(-1; -2; 4) ; D(5; 8; 4)$$

Les points  $A, B, C, D$  sont-ils coplanaires?

### Exercice 6316



Dans l'espace muni d'un repère  $(O; I; J; K)$  orthonormé, on considère quatre points repérés par leurs coordonnées :

$$A(3; -1; 5) ; B(-2; 2; 3) ; C(-1; -2; 4) ; D(5; 8; 4)$$

Les points  $A, B, C, D$  sont-ils coplanaires?


## 8. Equation cartésienne du plan :

(+2 exercices pour les enseignants)

### Exercice 4125



On considère le cube  $ABCDEFGH$  représenté ci-dessous :



On munit l'espace du repère  $(D; \overrightarrow{DA}; \overrightarrow{DC}; \overrightarrow{DH})$ .

1. Nommer les plans admettant les équations cartésiennes suivantes :

- a.  $z = 0$
- b.  $y = 1$
- c.  $x + y = 1$
- d.  $x + y + z = 2$
- e.  $x + y + z = 1$
- f.  $x - y = 0$

2. Déterminer l'équation cartésienne de chacun des plans suivants :

- a.  $(EHD)$
- b.  $(FGH)$
- c.  $(HDC)$

3. a. Justifier que le vecteur  $\overrightarrow{BG}$  est orthogonal au plan  $(EFC)$ .


b. En déduire une équation du plan  $(EFC)$ .

**Exercice 4119**

On considère les quatre points suivants :

1. le plan  $(P_1)$  est parallèle au plan  $(OAB)$  et passe par le point  $C$  ;
2. le plan  $(P_2)$  est passant par les points  $A, B, C$  ;
3. le plan  $(P_3)$  médian du segment  $[OB]$  ;
4. le plan  $(P_4)$  est parallèle au plan  $(OAB)$  et passe par le point  $O$  ;

Associer à chaque plan une des représentations ci-dessous et donner son équation cartésienne.



**Exercice 5418**

Dans l'espace muni d'un repère  $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ , on considère le plan  $(P)$  passant par le point  $A(1; 2; -1)$  et admettant le vecteur  $\vec{n}(1; -1; 3)$  pour vecteur normal.

1. Déterminer une équation cartésienne du plan  $P$ .
2. Les points  $B(2; 8; 1)$  et  $C(-2; 5; 1)$  appartiennent-ils au plan  $P$  ?

**Exercice 5416**

Dans l'espace muni d'un repère  $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$  orthonormé, on considère le plan  $(P)$  passant par le point  $A$  et admettant  $\vec{n}$  pour vecteur normal où :

$$A(3; 1; 2) \quad ; \quad \vec{n}(2; 1; -1)$$

On considère les points  $M$  et  $N$  deux points de l'espace où :

$$M(4; -2; 1) \quad ; \quad N(-2; 8; 2)$$

Les points  $M$  et  $N$  appartiennent-ils au plan  $(P)$  ?

**Exercice 4097**

L'espace est muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ .

On considère les points :

$$A(1; -1; 4) \quad ; \quad B(7; -1; -2) \quad ; \quad C(1; 5; -2)$$

1. Justifier que les trois points  $A, B, C$  forment un plan.
2. Montrer que le vecteur  $\vec{n}(1; 1; 1)$  est un vecteur normal au plan  $(ABC)$ .
3. En déduire que  $x + y + z - 4 = 0$  est une équation cartésienne du plan  $(ABC)$ .

9. Equation cartésienne du plan - recherche du vecteur normal : (+3 exercices pour les enseignants)

**Exercice 4111**

L'espace est muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ .

On considère le plan  $(P)$  admettant l'équation cartésienne suivante :

$$(P) : 5 \cdot x - 2 \cdot y + z - 5 = 0$$

1. Donner les coordonnées d'un vecteur  $\vec{n}$  normal au plan  $(P)$ .
2. Déterminer l'équation du plan  $(Q)$  parallèle au plan  $(P)$  et passant par le point  $A(5; -1; 2)$

**Exercice 4112**

L'espace est muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ .

On considère les points  $A(2; -3; -1)$  et  $B(-1; 1; 0)$ .

Déterminer l'équation du plan médiateur du segment  $[AB]$ .

## 10. Positions relatives de plans :

(+2 exercices pour les enseignants)

### Exercice 5420



Dans l'espace muni d'un repère  $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ , on considère les deux plans  $(\mathcal{P})$  et  $(\mathcal{P}')$  admettant pour équation

cartésienne:

$$(\mathcal{P}) : 2x - y + z + 3 = 0 \quad ; \quad (\mathcal{P}') : -4x + 2y - 2z - 1 = 0$$

Justifier que ces deux plans sont parallèles.

## 11. Plan sécant et représentation paramétrique de l'intersection :

(+4 exercices pour les enseignants)

### Exercice 3129



L'espace est muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ . Soit  $(\mathcal{P}_1)$  le plan d'équation cartésienne  $-2x + y + z - 6 = 0$  et  $(\mathcal{P}_2)$  le plan d'équation cartésienne  $x - 2y + 4z - 9 = 0$ .

1. Montrer que  $(\mathcal{P}_1)$  et  $(\mathcal{P}_2)$  sont perpendiculaires.

On rappelle que deux plans sont perpendiculaires si, et seulement si, un vecteur normal non nul à l'un est orthogonal à un vecteur normal non nul à l'autre.

2. Soit  $(D)$  la droite d'intersection de  $(\mathcal{P}_1)$  et  $(\mathcal{P}_2)$ . Montrer qu'une représentation paramétrique de  $(d)$  est :

$$\begin{cases} x = -7 + 2t \\ y = -8 + 3t \\ z = t \end{cases}$$

### Exercice 5421



Dans l'espace muni d'un repère  $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ , on considère les deux plans  $(\mathcal{P})$  et  $(\mathcal{P}')$  admettant pour équation cartésienne:

$$(\mathcal{P}) : x + 2y - z + 3 = 0 \quad ; \quad (\mathcal{P}') : 4x - 2y + z - 1 = 0$$

1. Justifier que ces deux plans sont sécants.
2. Déterminer une représentation paramétrique de la droite  $(d)$  intersection des plans  $(\mathcal{P})$  et  $(\mathcal{P}')$ .

## 12. Positions relatives de droites et de plans :

(+4 exercices pour les enseignants)

### Exercice 4088



L'espace est muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ .

On considère:

- $(\mathcal{P})$  est le plan passant par  $A(3; 1; 2)$  et de vecteur normal  $\vec{n}(1; -4; 1)$ ;
- $(d)$  est la droite passant par  $B(1; 4; 2)$  de vecteur directeur  $\vec{u}(1; 1; 3)$ .

1. Démontrer que le plan  $(\mathcal{P})$  a pour équation cartésienne:  $x - 4y + z - 1 = 0$
2. Montrer que la droite  $(d)$  est strictement parallèle au plan  $\mathcal{P}$ .

### Exercice 5422



Dans l'espace muni d'un repère  $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ , on considère la droite  $(d)$  admettant la représentation paramétrique et le plan  $(\mathcal{P})$  admettant l'équation cartésienne définies par :

$$(d) : \begin{cases} x = 3 - t \\ y = 2 - t \\ z = t \end{cases} \quad ; \quad (\mathcal{P}) : 2x - 4y - 2z + 3 = 0$$

1. a. Justifier que la droite  $(d)$  est parallèle au plan  $(\mathcal{P})$ .  
b. La droite  $(d)$  est-elle incluse dans le plan  $(\mathcal{P})$ ?

2. On considère le plan  $(\mathcal{P}')$  admettant pour équation cartésienne:

$$(\mathcal{P}') : 2x - 4y - 2z + c = 0 \quad \text{où } c \in \mathbb{R}$$

Déterminer la valeur du paramètre  $c$  afin que la droite  $(d)$  soit incluse dans le plan  $(\mathcal{P}')$ .

### Exercice 5423



Dans l'espace muni d'un repère  $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ , on considère la droite  $(d)$  admettant la représentation paramétrique et le plan  $(\mathcal{P})$  admettant l'équation cartésienne définies par :

$$(d) : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 3 + 2t \end{cases} \quad ; \quad (\mathcal{P}) : 3x - y + 2z + 1 = 0$$

1. Justifier que la droite  $(d)$  est sécante au plan  $(\mathcal{P})$ .
2. Déterminer les coordonnées du point d'intersection de la droite  $(d)$  et du plan  $(\mathcal{P})$ .

### Exercice 4037



L'espace est muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ .

On note  $(D)$  la droite passant par les points  $A(1; -2; -1)$  et  $B(3; -5; -2)$ .

1. Montrer qu'une représentation paramétrique de la droite  $(D)$  est :

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 - 3t \\ z = -1 - t \end{cases} \quad \text{avec } t \in \mathbb{R}.$$

2. On note  $(D')$  la droite ayant pour représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = 2 - k \\ y = 1 + 2k \\ z = k \end{cases} \quad \text{avec } k \in \mathbb{R}.$$


Montrer que les droites  $(D)$  et  $(D')$  ne sont pas coplanaires.

3. On considère le plan  $(\mathcal{P})$  d'équation  $4x + y + 5z + 3 = 0$ .

- a. Montrer que le plan  $(\mathcal{P})$  contient la droite  $(D)$ .
- b. Montrer que le plan  $(\mathcal{P})$  et la droite  $(D')$  se coupent en un point  $C$  dont on précisera les coordonnées.

### Exercice 4129

Dans l'espace, on considère le cube  $ABCDEFGH$ . Les points  $I$  et  $J$  représentent respectivement les centres des faces  $ABCD$  et  $ABFE$ .



On munit l'espace du repère  $(A; \vec{AB}; \vec{AD}; \vec{AE})$ .

1.
  - a. Donner les coordonnées des points  $I$  et  $J$ .
  - b. Donner une représentation paramétrique de la droite  $(IJ)$ .

2. On considère la droite  $(\Delta)$  admettant la représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = \frac{1}{2} + 2t \\ z = -t \end{cases} \quad \text{où } t \in \mathbb{R}$$

Démontrer que les droites  $(\Delta)$  et  $(IJ)$  sont non-coplanaires.

3.
  - a. Justifier que le plan  $(AGH)$  admet pour équation :  $y - z = 0$
  - b. Déterminer les coordonnées du point d'intersection de la droite  $(IJ)$  et du plan  $(AGH)$ .

## 14. Un peu plus :

(+1 exercice pour les enseignants)

### Exercice 4317

On considère un cube  $ABCDEFGH$ , d'arête de longueur 1. On note  $I$  le point d'intersection de la droite  $(EC)$  et du plan  $(AFH)$ .

1. On se place dans le repère  $(D; \vec{DA}; \vec{DC}; \vec{DH})$ . Dans ce repère, les sommets du cube ont pour coordonnées :

$$\begin{aligned} A(1; 0; 0) & ; B(1; 1; 0) & ; C(0; 1; 0) & ; D(0; 0; 0) \\ E(1; 0; 1) & ; F(1; 1; 1) & ; G(0; 1; 1) & ; H(0; 0; 1) \end{aligned}$$

- a. Déterminer une représentation paramétrique de la droite  $(EC)$ .
- b. Déterminer une équation cartésienne du plan  $(AFH)$ .
- c. En déduire les coordonnées du point  $I$ , puis montrer que le point  $I$  est le projeté orthogonal du point  $E$  sur le plan  $(AFH)$ .
- d. Vérifier que la distance du point  $E$  au plan  $(AFH)$  est égale à  $\frac{\sqrt{3}}{3}$ .
- e. Démontrer que la droite  $(HI)$  est perpendiculaire à la droite  $(AF)$ .  
Que représente le point  $I$  pour le triangle  $AFH$ ?


2. Dans la suite de cet exercice, toute trace de recherche,

même incomplète, ou d'initiative, même non fructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation.

Définitions :

- Un tétraèdre est dit de type 1 si ses faces ont même aire;
- il est dit de type 2 si les arêtes opposées sont orthogonales deux à deux;
- il est dit de type 3 s'il est à la fois de type 1 et de type 2.

Préciser de quel(s) type(s) est le tétraèdre  $EAFH$ .



## 16. Ancienne annales (avant 2012) : (+1 exercice pour les enseignants)

### Exercice 3153



L'espace est muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ .

1. On considère le plan  $\mathcal{P}$  passant par le point  $B(1; -2; 1)$  et de vecteur normal  $\vec{n}(-2; 1; 5)$  et le plan  $\mathcal{R}$  d'équation cartésienne  $x+2y-7=0$ 
  - a. Démontrer que les plans  $\mathcal{P}$  et  $\mathcal{R}$  sont perpendiculaires.
  - b. Démontrer que l'intersection des plans  $\mathcal{P}$  et  $\mathcal{R}$  est la droite  $\Delta$  passant par le point  $C(-1; 4; -1)$  et de vecteur directeur  $\vec{u}(2; -1; 1)$ .
  - c. Soit le point  $A(5; -2; -1)$ . Calculer la distance du point  $A$  au plan  $\mathcal{P}$  puis la distance du point  $A$  au plan  $\mathcal{R}$ .
  - d. Déterminer la distance du point  $A$  à la droite  $\Delta$ .
2. a. Soit, pour tout nombre réel  $t$ , le point  $M_t$  de coordonnées  $(1+2t; 3-t; t)$ . Déterminer en fonction de  $t$  la longueur  $AM_t$ .

On note  $\varphi(t)$  cette longueur. On définit ainsi une fonction  $\varphi$  de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ .

- a. Etudier le sens de variations de la fonction  $\varphi$  sur  $\mathbb{R}$ ; préciser son minimum.
- b. Interpréter géométriquement la valeur de ce minimum.

### Exercice 3126



L'espace est muni d'un repère  $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$  orthonormé

## 255. Exercices non-classés :

### Exercice 7247



Résoudre le système d'équations :


$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

### Exercice 8139



La figure ci-contre représente un cube  $ABCDEFGH$ . Les trois points  $I, J, K$  sont définis par les conditions suivantes :

- $I$  est le milieu du segment  $[AD]$
- $J$  est tel que :  $\vec{AJ} = \frac{3}{4} \cdot \vec{AE}$
- $K$  est le milieu du segment  $[FG]$ .



On note  $R$  le projeté orthogonal du point  $F$  sur le plan  $(IJK)$ . Le point  $R$  est donc l'unique point du plan  $(IJK)$  tel que la droite  $(FR)$  est orthogonale au plan  $(IJK)$ .

direct.

Il n'est pas demandé de faire de figure.

Les questions 3. et 4. sont indépendantes des questions 1. et 2.

On considère les quatre points  $A, B, C$  et  $I$  de coordonnées respectives :

$$A \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} ; B \begin{pmatrix} 1 \\ -6 \\ -1 \end{pmatrix} ; C \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} ; I \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

1. a. Calculer le produit vectoriel  $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$ .
  - b. Déterminer une équation cartésienne du plan contenant les trois points  $A, B, C$ .
2. Soit  $(Q)$  le plan d'équation :  $x+y-3z+2=0$  et  $(Q')$  le plan de repère  $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ .
  - a. Pourquoi  $(Q)$  et  $(Q')$  sont-ils sécants?
  - b. Donner un point  $E$  et un vecteur directeur  $\vec{u}$  de la droite d'intersection  $(\Delta)$  des plans  $(Q)$  et  $(Q')$ .
3. Ecrire une équation cartésienne de la sphère  $S$  de centre  $I$  et de rayon 2.
4. On considère les points  $J$  et  $K$  de coordonnées respectives :
 
$$\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} ; \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Déterminer avec soin l'intersection de la sphère  $(S)$  et de la droite  $(JK)$ .

On définit l'intérieur du cube comme l'ensemble des points

$$M(x; y; z) \text{ tels que : } \begin{cases} 0 < x < 1 \\ 0 < y < 1 \\ 0 < z < 1 \end{cases}$$

Le point  $R$  est-il à l'intérieur du cube?

### Exercice 5417



Dans l'espace muni d'un repère  $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ , on considère le plan  $(\mathcal{P})$  admettant pour équation cartésienne :

$$2 \cdot x + 3 \cdot y - z + 1 = 0$$

Le vecteur  $\vec{u}(4; -2; 2)$  admet-il un représentant inclus dans le plan  $(\mathcal{P})$ .

### Exercice 3858



L'espace est muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ .

On considère :



- le plan  $\mathcal{P}$  passant par le point  $B(1; -2; 1)$  et de vecteur normal  $\vec{n}(-2; 1; 5)$ ;
- le plan  $\mathcal{R}$  d'équation cartésienne:  $x+2y-7=0$ .

1. Démontrer que les plans  $\mathcal{P}$  et  $\mathcal{R}$  sont perpendiculaires.
2. Démontrer que l'intersection des plans  $\mathcal{P}$  et  $\mathcal{R}$  est la droite  $\Delta$  passant par le point  $C(-1; 4; -1)$  et de vecteur directeur  $\vec{u}(2; -1; 1)$ .
3. Soit le point  $A(5; -2; -1)$ . Calculer la distance du point  $A$  au plan  $\mathcal{P}$  puis la distance du point  $A$  au plan  $\mathcal{R}$ .
4. Déterminer la distance du point  $A$  à la droite  $\Delta$ .

#### Exercice 4089



Le plan  $\mathcal{Q}$  d'équation  $x-y+z-11=0$  est tangent à une sphère  $\mathcal{S}$  de centre le point  $\Omega$  de coordonnées  $(1; -1; 3)$ .

1. Déterminer le rayon de la sphère  $\mathcal{S}$ .
2. Déterminer un système d'équations paramétriques de la droite  $\Delta$  passant par  $\Omega$  et orthogonale au plan  $\mathcal{Q}$ .
3. En déduire les coordonnées du point d'intersection de la sphère  $\mathcal{S}$  et du plan  $\mathcal{Q}$ .

#### Exercice 4106



Dans l'espace muni d'un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ , on donne les points:

$$A(3; 2; -1) \quad ; \quad B(-6; 1; 1)$$

$$C(4; -3; 3) \quad ; \quad D(-1; -5; -1)$$

1. Vérifier qu'une équation cartésienne du plan  $(BCD)$  est:  $-2x - 3y + 4z - 13 = 0$
2. Déterminer les coordonnées du point  $H$ , projeté orthogonal du point  $A$  sur le plan  $(BCD)$ .
3. Calculer le produit scalaire  $\vec{BH} \cdot \vec{CD}$ .

#### Exercice 4134



L'espace est muni du repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$  et on désigne par  $\mathcal{P}$  le plan d'équation:


$$3x + 2y = 29$$

1. Démontrer que  $\mathcal{P}$  est parallèle à l'axe  $(Oz)$  de vecteur directeur  $\vec{k}$ .
2. Déterminer les coordonnées des points d'intersection du plan  $\mathcal{P}$  avec les axes  $(Ox)$  et  $(Oy)$  de vecteurs directeurs respectifs  $\vec{i}$  et  $\vec{j}$ .
3. Faire une figure et tracer les droites d'intersection du plan  $\mathcal{P}$  avec les trois plans de coordonnées.
4. Sur la figure précédente, placer sur la droite d'intersection des plans  $\mathcal{P}$  et  $(xOy)$ , les points dont les coordonnées sont à la fois entières et positives.

#### Exercice 4329



On considère le cube  $ABCDEFGH$  de côté 1 représenté ci-dessous :



Dans tout l'exercice, l'espace est rapporté au repère orthonormé  $(D; \vec{DA}; \vec{DC}; \vec{DH})$ .

On note  $K$  le barycentre des points pondérés  $(D; 1)$  et  $(F; 2)$

#### Partie A

1. Montrer que le point  $K$  a pour coordonnées  $(\frac{2}{3}; \frac{2}{3}; \frac{2}{3})$ .
2. Montrer que les droites  $(EK)$  et  $(DF)$  sont orthogonales.
3. Calculer la distance  $EK$ .

#### Partie B

Soit  $M$  un point du segment  $[HG]$ .

On note  $m = HM$  ( $m$  est donc un réel appartenant à  $[0; 1]$ ).

1. Montrer que, pour tout réel  $m$  appartenant à l'intervalle  $[0; 1]$ , le volume du tétraèdre  $EMFD$ , en unités de volume, est égal à  $\frac{1}{6}$ .
2. Montrer qu'une équation cartésienne du plan  $(MFD)$  est:  $(-1+m) \cdot x + y - m \cdot z = 0$ .
3. On note  $d_m$  la distance du point  $E$  au plan  $(MFD)$ .
  - a. Montrer que, pour tout réel  $m$  appartenant à l'intervalle  $[0; 1]$ : 
$$d_m = \frac{1}{\sqrt{2 \cdot m^2 - 2 \cdot m + 2}}$$
  - b. Déterminer la position de  $M$  sur le segment  $[HG]$  pour laquelle la distance  $d_m$  est maximale.
  - c. En déduire que lorsque la distance  $d_m$  est maximale, le point  $K$  est le projeté orthogonal de  $E$  sur le plan  $(MFD)$ .


#### Exercice 6068



On considère le cube  $ABCDEFGH$ , d'arête de longueur 1,

et on note  $I$  et  $J$  les milieux des arêtes  $[AB]$  et  $[CG]$ . On utilisera le repère  $(A; \vec{AB}; \vec{AD}; \vec{AE})$

1. Déterminer l'équation cartésienne du plan  $EFJ$ .
2. Déterminer les coordonnées du point  $P$  projeté du point  $I$  sur le plan  $(EFJ)$ .
3. Déterminer la distance  $IP$ .




4. Montrer que le volume du tétraèdre  $EFIJ$  est égal à  $\frac{1}{6}$

**Exercice 4046**



On considère un cube  $ABCDEFGH$  d'arête de longueur 1. On désigne par  $I$  le milieu de  $[EF]$  et par  $J$  le symétrique de  $E$  par rapport à  $F$ .




Dans tout l'exercice, l'espace est rapporté au repère orthonormé  $(A; \vec{AB}; \vec{AD}; \vec{AE})$ .

- Déterminer les coordonnées des points  $I$  et  $J$ .
  - Vérifier que le vecteur  $\vec{DJ}$  est un vecteur normal au plan  $(BGI)$ .
  - En déduire une équation cartésienne du plan  $(BGI)$ .
  - Calculer la distance du point  $F$  au plan  $(BGI)$ . (hors programme 2012).
- On note  $(\Delta)$  la droite passant par  $F$  et orthogonale au plan  $(BGI)$ .
  - Donner une représentation paramétrique de la droite  $(\Delta)$ .
  - Montrer que la droite  $(\Delta)$  passe par le centre  $K$  de la face  $ADHE$ .
  - Montrer que la droite  $(\Delta)$  et le plan  $(BGI)$  sont sécants en un point, noté  $L$ , de coordonnées  $\left(\frac{2}{3}; \frac{1}{6}; \frac{5}{6}\right)$ .
  - Dans cette question, toute trace de recherche, même incomplète, sera prise en compte dans l'évaluation.  
Le point  $L$  est-il l'orthocentre du triangle  $BGI$ ?

**Exercice 6882**



$ABCDEFGH$  désigne un cube de côté 1. Le point  $I$  est le milieu du segment  $[BF]$ . Le point  $J$  est le milieu du segment  $[BC]$ . Le point  $K$  est le milieu du segment  $[CD]$ .



**Partie A**

Dans cette partie, on ne demande aucune justification

On admet que les droites  $(IJ)$  et  $(CG)$  sont sécantes en un point  $L$ .

Construire, sur la figure fournie ci-dessus et en laissant apparent les traits de construction :

- le point  $L$  ;
- l'intersection  $\mathcal{D}$  des plans  $(IJK)$  et  $(CDH)$  ;
- la section du cube par le plan  $(IJK)$ .

**Partie B**

L'espace est rapporté au repère  $(A; \vec{AB}; \vec{AD}; \vec{AE})$ .

- Donner les coordonnées  $A, G, I, J$  et  $K$  dans ce repère.
- Montrer que le vecteur  $\vec{AG}$  est normal au plan  $(IJK)$ .
  - En déduire une équation cartésienne du plan  $(IJK)$ .
- On désigne par  $M$  un point du segment  $[AG]$  et  $t$  le réel de l'intervalle  $[0; 1]$  tel que  $\vec{AM} = t \cdot \vec{AG}$ .
  - Démontrer que:  $MI^2 = 3 \cdot t^2 - 3 \cdot t + \frac{5}{4}$
  - Démontrer que la distance  $MI$  est minimale pour le point  $N \left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$ .
- Démontrer que pour ce point  $N \left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$  :
  - $N$  appartient au plan  $(IJK)$ .
  - La droite  $(IN)$  est perpendiculaire aux droites  $(AG)$  et  $(BF)$ .